

TEXTOS DE ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón conteniendo frascos de polietileno de baja densidad de 10 x 500 ml
Cajas de cartón conteniendo frascos de polietileno de baja densidad de 10 x 1000 ml
Cajas de cartón conteniendo bolsas de plástico de 2 x 5000 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lactato-RingerVet solución para perfusión para bovino, caballos, ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

100 ml contienen:

Sustancias activas:

Cloruro de sodio	0,600 g
Cloruro de potasio	0,040 g
Cloruro de calcio dihidrato	0,027 g
(S)-Lactato de sodio	0,312 g
(como solución de lactato de sodio (50% p/v)	0,624 g)

Electrolitos:

Sodio	130,49 mmol/l
Potasio	5,37 mmol/l
Calcio	1,84 mmol/l
Cloruro	111,70 mmol/l
Lactato	27,84 mmol/l

3. FORMA FARMACÉUTICA

Exento de endotoxinas bacterianas.

Osmolaridad teórica	277 mOsm/l
Acidez valorada	< 1 mmol/l
pH	5,0 – 7,0

Solución para perfusión.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Frascos de polietileno: 10 x 500 ml; 10 x 1000 ml
Bolsas de plástico: 2x 5000 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-03



Lea el prospecto antes de usar.

6. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN

Para un solo uso.

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

Utilizar inmediatamente después de abrir el envase primario.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

Fascos de polietileno: Conservar el frasco en el embalaje exterior.

Bolsas de plástico: Conservar la bolsa en el embalaje exterior.

No refrigerar o congelar.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminación: Lea el prospecto antes de usar.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

B. Braun VetCare SA,
08191 Rubí (Barcelona), España

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1520 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}



DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Frascos de polietileno de baja densidad de 500 ml
Frascos de polietileno de baja densidad de 1000 ml
Bolsas de plástico de 5000 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lactato-RingerVet solución para perfusión para bovino, caballos, ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

100 ml contienen:

Sustancias activas:

Cloruro de sodio	0,600 g
Cloruro de potasio	0,040 g
Cloruro de calcio dihidrato	0,027 g
(S)-Lactato de sodio	0,312 g
(como solución de lactato de sodio (50% p/v)	0,624 g)

Electrolitos:

Sodio	130,49 mmol/l
Potasio	5,37 mmol/l
Calcio	1,84 mmol/l
Cloruro	111,70 mmol/l
Lactato	27,84 mmol/l

3. FORMA FARMACÉUTICA

Exento de endotoxinas bacterianas.
Osmolaridad teórica 277 mOsm/l
Acidez valorada < 1 mmol/l
pH 5,0 – 7,0

Solución para perfusión.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Frascos de polietileno: 500 ml; 1000 ml
Bolsas de plástico: 5000 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Lea el prospecto antes de usar.

6. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN

Para un solo uso.

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

Utilizar inmediatamente después de abrir el envase primario.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

Frascos de polietileno: Conservar el frasco en el embalaje exterior.

Bolsas de plástico: Conservar la bolsa en el embalaje exterior.

No refrigerar o congelar.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminación: Lea el prospecto antes de usar.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

B. Braun VetCare SA,
08191 Rubí (Barcelona), España

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1520 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

