

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/98/0814
Ketosaid šķīdums iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Lielbritānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ketosaid šķīdums iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām
Propylene glycol

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Propilēnglikols 0,9996 ml

Palīgviela:

Karmoizīns (E122) līdz 1 ml

Viskozs, sarkans šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Palīg līdzeklis acetonēmijas un ketozes ārstēšanai liellopiem un aitām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Liellopiem: 200 ml divas reizes dienā pirmajā dienā un 100 ml divas reizes dienā turpmākās trīs dienas, ievadot iekšķīgi ar zondi.

Aitām: 100 ml dienā četras dienas pēc kārtas, ievadot iekšķīgi ar zondi.

Pirms ievadīšanas precīzi jānomēra devas, pārlejot Ketosaid no oriģinālā konteinera tīrā, sausā, piemērota izmēra traukā ar iedaļām milimetros (piemēram, mērglāzē).

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tā kā ketoze aitām rodas no prenatālā metaboliskā stresa, ārstēšanu ar Ketosaid var turpināt līdz simptomu izzušanai vai līdz dzemdībām. Šajā laikā ir ieteicama vispārēja ēdināšanas uzlabošana.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja parādās kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību.

Izvairīties no nejaušas zāļu saskares ar acīm.

Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Plastikāta konteineri pa 1 l; 2,5 l; 5 l un 10 l.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.