

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας<και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

(Εταιρεία) Όνομα: **DIVASA-FARMAVIC, S.A.**

Διεύθυνση: **Ctra Sant Hipòlit, km 71. 08503 Gurb-Vic (Barcelona)**

Χώρα: **SPAIN**

Τηλέφωνο: **+34 938860100**

Telefax: **+34 938890131**

E-Mail: **info@divasa-farmavic.com**

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TABERDOG περιλαίμιο σκύλου – Περμεθρίνη (25% cis/75% trans) 103,3 MG/G

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σύνθεση του περιλαίμιου:

Δραστικό(ά) συστατικό(ά):

Περμεθρίνη(25% cis/75% trans)

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Εξωπαρασιτώσεις που οφείλονται σε :

Ψύλλους: *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*, *Pulex irritans*

Ψείρες: *Lignognathus* spp

Κρότωναes : *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Otobius megnini*.

Απωθητικό για μύγες και κουνούπια.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί στους σκύλους.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ένα (1) περιλαίμιο ανά ζώο κάθε 4 μήνες.

Τοποθετήστε το περιλαίμιο στο λαιμό του ζώου χωρίς να ασκήσετε πίεση, αφήνοντας αρκετό χώρο, 3-4 εκατοστά με το λαιμό του ζώου.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Η συσκευασία του περιλαίμιου θα πρέπει να ανοίγεται μόνο πριν τη χρήση.

Μετά από την τοποθέτηση του περιλαίμιου, το πλεονάζον τμήμα να κόβεται.

Να αποφεύγεται το δάγκωμα του περιλαίμιου από το ζώο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται

11. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Σε περίπτωση εκτεταμένου τοπικού ερεθισμού ή εμφανούς αλλεργικής αντίδρασης, αφαιρέστε αμέσως το περιλαίμιο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Πλυθείτε με νερό και σαπουνι μετά την επαφή με το προϊόν.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την επαφή με το προϊόν.

Κρατήστε το μακριά από στερεά και υγρά τρόφιμα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία:

Δεν έχουν αναφερθεί αντενδείξεις σε αυτές τις περιόδους

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν είναι γνωστή καμία αλληλεπίδραση.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα :

Η μέθοδος χρήσης του προϊόντος καθιστά απίθανη τη δηλητηρίαση λόγω υπερδοσολογίας

Ασυμβατότητες:

Δεν είναι γνωστή καμία.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Νοέμβριος 2023