

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN –
KOMBINERAD MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL**

Aluminiumflaska (540 ml, 1 liter)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Folliplan vet. 4 mg/ml oral lösning

2. SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Altrenogest 4,0 mg

Hjälpämnen:

Butylhydroxytoluen (E321) 0,07 mg

Butylhydroxyanisol (E320) 0,07 mg

Klar, gul lösning.

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

540 ml

1 liter

4. DJURSLAG

Svin (gyltor).

5. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Användningsområden

För synkronisering och kontroll av brunst hos gyltor med cyklisk aktivitet.

6. KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer

Använd inte till galtar.

Använd inte till dräktiga suggor eller suggor med livmoderinfektion.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

7. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar

Använd endast till könsmogna gyltor som visat brunst.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Läkemedlet bör inte hanteras av gravida kvinnor eller kvinnor som kan vara gravida. Fertila kvinnor ska undvika kontakt med läkemedlet.

Detta läkemedel bör inte hanteras av:

- personer med kända eller misstänkta progesteronberoende tumörer
- personer med tromboemboliska störningar (blodproppar)

Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta genast med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noga med vatten i 15 minuter, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Skyddsutrustning i form av overall och handskar ska användas vid hantering av läkemedlet. Latexhandskar eller andra otäta (porösa) handskar kan släppa igenom läkemedlet. Absorption genom huden kan bli ännu högre när hudområdet är täckt av ett tätslutande material.

Tvätta händerna efter användning.

Effekter av överexponering: Upprepad, oavsiktlig absorption kan leda till störningar av menstruationscykeln, livmoder- eller magkramper, ökad eller minskad menstruationsblödning, förlängning av graviditet eller huvudvärk.

Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:

Vid spridning av gödsel från behandlade djur måste det minsta avståndet till ytvatten såsom definierat i nationella eller lokala föreskrifter följas strikt, eftersom gödseln kan innehålla altrenogest som kan leda till negativa effekter på vattenmiljön.

Dräktighet och digivning:

Använd inte under dräktighet och digivning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Uppgift saknas.

Överdoser:

Information saknas.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

8. BIVERKNINGAR

Biverkningar

Svin (gyltor):

Inga kända.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns på denna förpackning, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning eller den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna på denna förpackning, eller via:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

9. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Användning i foder.

Tillsätt läkemedlet till fodret omedelbart före utfodring.

5 ml (motsvarande 20 mg altrenogest) per djur under 18 dagar.

10. RÅD OM KORREKT ADMINISTRERING

Råd om korrekt administrering

Avlägsna skruvlocket och förslutningen och mät upp dosen om 5 ml med hjälp av den medföljande doseringskoppen. Håll dosen på fodret och stäng flaskan med förslutningen och skruvlocket efter varje användning.

Säkerställ att allt foder med det inblandade läkemedlet har konsumerats.

Säkerställ att den korrekta dosen ges dagligen eftersom underdosering kan leda till bildning av follikelcystor (äggstockscystor).

Överblivet, ej konsumerat eller delvis konsumerat foder som innehåller läkemedel ska kasseras på ett säkert sätt och inte ges till något annat djur.

11. KARENSTIDER

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.

12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

13. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION

Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av att altrenogest kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fråga veterinär eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används.

14. KLASSIFICERING AV DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.

15. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR

MTnr: 53645

Förpackningsgrörlekar

Kartong med en aluminiumflaska om 540 ml eller 1 liter, med en förslutning av lågdensitets-polyeten och skruvlock av polypropen. En doseringskopp medföljer båda förpackningsgrörlekarna.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsgrörlekar att marknadsföras.

16. DATUM DÅ FÖRPACKNINGSGRÖRLEKATIONEN SENAST ÄNDRADES

Datum då förpackningsgrörlektionen senast ändrades

14 november 2025

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrike

Lokal företrädare och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

MSD Animal Health Sweden AB

Tel.: +46 (8) 522 216 60

Email: msdah.sweden@msd.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

18. ÖVRIG INFORMATION

19. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

20. UTGÅNGSDATUM

Exp {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 90 dagar, före ____/____/____.

21. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}