

Gebrauchsinformation

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Pharmazeutischer Unternehmer:

ZIEGLER GmbH Homöopathika ad us. vet.
Ötzer Str. 10
86672 Thierhaupten

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Flor de piedra compositum

Flüssige Verdünnung zur Injektion.

Für Tiere: Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, kleine Heimtiere

Homöopathisches Arzneimittel

Injektionsflaschen mit 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion.
Unverkäufliches Muster mit 10 ml.

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

10 g (=10 ml) Flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten:

Wirkstoff(e):

Aconitum napellus Dil. D4	0,20 g
Acidum arsenicosum Dil. D4	0,20 g
Echinacea Dil. D4	0,20 g
Lophophytum leandri Dil. D4	0,20 g
Lachesis Dil. D8	0,20 g

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Natriumchlorid
Wasser für Injektionszwecke

Anwendungsgebiet(e)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Flor de piedra compositum

gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen

Aufgrund des Bestandteils Echinacea muss Flor de piedra compositum bei fortschreitenden Systemerkrankungen mit Vorsicht angewendet werden. Hierzu zählen unter anderem:

- chronisch Virusinfektionen wie z.B. Leukose oder FIV,
- Autoimmunerkrankungen wie z.B. Rheuma oder Lupus erythematodes,
- Diabetes mellitus

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Zur Verträglichkeit von Flor de piedra compositum bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart(en)

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, kleine Heimtiere

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Erwachsene Pferde und Rinder:	10 ml pro Tier
Kälber, Schweine:	5 ml pro Tier
Schafe, Ziegen:	max. 3 ml pro Tier
Ferkel:	max. 0,2 ml/kg Körpergewicht insgesamt nicht mehr als 3 ml pro Tier
Hunde:	max. 0,2 ml/kg Körpergewicht insgesamt nicht mehr als 5 ml pro Tier
Katzen:	max. 0,2 ml/kg Körpergewicht insgesamt nicht mehr als 1 ml pro Tier
Kleine Heimtiere:	max. 0,2 ml/kg Körpergewicht insgesamt nicht mehr als 1 ml pro Tier

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 24 Stunden zu wiederholen.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.

Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Flor de piedra compositum mit Vorsicht eingesetzt werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:
Keine

Wartezeit

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege	Essbare Gewebe	0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege	Milch	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

...

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 401046.00.00