

## A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte de 1 flacon de 100 ml  
Boîte de 1 flacon de 250 ml  
Boîte de 10 boîtes de 1 flacon de 100 ml  
Boîte de 30 boîtes de 1 flacon de 100 ml  
Boîte de 12 boîtes de 1 flacon de 250 ml

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Peniyet vet 300 mg/ml suspension injectable pour bovins, moutons et porcs  
Procaïne benzylpénicilline monohydrate

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Un ml contient :  
Procaïne benzylpénicilline monohydrate ..... 300 mg  
(correspond à 170,40 mg de benzylpénicilline)

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Suspension injectable

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 ml  
250 ml  
10x100 ml  
30x100 ml  
12x250 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, moutons et porcs

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire. Bien secouer avant utilisation.

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Porcs :

Viande et abats : 6 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
8 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Bovins :

Viande et abats : 6 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
8 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Lait : 96 heures (4 jours)

**Moutons :**

Viande et abats : 4 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
6 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours  
Lait : 156 heures (6,5 jours)

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Les pénicillines et les céphalosporines peuvent occasionnellement provoquer des réactions allergiques sévères. Voir la notice pour les avertissements destinés à l'utilisateur.

**10. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP {mois/année}

Après ouverture, utiliser avant : <Uniquement pour les boîtes individuelles>

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours entre 2°C et 8°C.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Elimination : lire la notice.

**13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT**

Usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Laboratorios Syva, s.a.u.  
Avda. Párroco Pablo Díez,  
49-57 (24010) León  
Espagne

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V541520

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

Étiquette flacon de 100 ml

Étiquette flacon de 250 ml

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Peniyet vet 300 mg/ml suspension injectable pour bovins, moutons et porcs

Procaïne benzylpénicilline monohydrate

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Un ml contient :

Procaïne benzylpénicilline monohydrate.....300 mg

(correspond à 170,40 mg de benzylpénicilline)

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Suspension injectable

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 ml

250 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, moutons et porcs

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire. Bien secouer avant utilisation.

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Porcs :Viande et abats : 6 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
8 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 joursBovins :Viande et abats : 6 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
8 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours  
Lait : 96 heures (4 jours)Moutons :Viande et abats : 4 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours  
6 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours  
Lait : 156 heures (6,5 jours)

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP {mois/année}

Après ouverture, utiliser avant :

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours entre 2°C et 8°C.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT****13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT**

Usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »****15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Laboratorios Syva s.a.u.  
Avda. Párroco Pablo Díez,  
49-57 (24010) León  
Espagne

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V541520

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}