

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{FALTSCHACHTEL}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Enrox Max 100 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält 100 mg Enrofloxacin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind und Schwein



**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind: **s.c., i.v.**

Schwein: **i.m.**

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind:

essbare Gewebe: s.c.: 14 Tage

i.v.: 7 Tage

Milch: s.c.: 120 Stunden

i.v.: 72 Stunden

Schwein:

essbare Gewebe: i.m.: 12 Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht einfrieren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

KRKA

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 835160

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{GLASFLASCHE 100 ml}

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enrox Max 100 mg/ml Injektionslösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 100 mg Enrofloxacin.

### 3. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schwein



### 4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: **s.c., i.v.**

Schwein: **i.m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:

essbare Gewebe: s.c.: 14 Tage

i.v.: 7 Tage

Milch: s.c.: 120 Stunden

i.v.: 72 Stunden

Schwein:

essbare Gewebe: i.m.: 12 Tage

### 6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht einfrieren.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

KRKA

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**10. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

100 ml