

[Version 9.1, 11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic V.H., šnypščioji tabletė vištoms ir kalakutams

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje dozėje yra:

veikliosios medžiagos:

lentogeninių V.H. padermės Niukaslo ligos virusų – ne mažiau kaip $10^{6,0}$ EID₅₀*

* EID₅₀ infekcinė dozė 50 % kiaušinių (Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuris, kaip numatoma, užkrės 50 procentų apvaisintų kiaušinių, į kuriuos yra inokuluotas).

pagalbinių medžiagų:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Natrio bikarbonatas
Bevandenė citrinų rūgštis
Magnio stearatas

Apskrita balkšva (beveik kreminė) šnypščioji tabletė.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Aktyviam vištų ir kalakutų vakcinavimui nuo Niukaslo ligos.

Imuniteto pradžia: Po pirmos vakcinacijos imunitetas pasireiškia praėjus 5 dienoms, bet pilnas imunitetas susidaro praėjus 2 sav. po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė : 2 mėnesiai.

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus, nepaveiktus streso veiksnių, tokių kaip perpildymas, persildymas, šaltis, nepakankamas šėrimas ir kt.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims
Netaikytinos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai pavartojus, prarijus, patekus ant odos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Vakcina gali sukelti vakcinuojantiems žmonėms nedidelį konjunktyvitą, kuris gali trukti 2-3 dienas, tad apsaugokite akis nuo tiesioginio sąlyčio su vakcina. Naudojant šią vakciną būtinos asmeninės apsaugos priemonės (apsauginiai akiniai ir kaukės).

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Nepastebėta.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Netaikytina.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Šią vakciną galima naudoti su geriamuoju vandeniu, infuzija į akį arba purškiant stambiais lašais arba aerozoliu.

Norint gauti gerus rezultatus ir užtikrinti pilną paukščių apsaugą per visą jų augimo periodą iki pat skerdimo (7-8 sav.) bei tėvinius pulkus ir dedekles kiaušinių dėjimo metu, rekomenduotina vakcinuoti viščiukus du kartus, 1-mą ir 17-tą amžiaus dieną.

Būtina tinkamai dozuoti (negalima gerti mažiau, geriau perdozuoti, nes vakcina nėra žalinga).

Gyvosios vakcinos yra jautrios orui, saulės šviesai, karščiui, dezinfekantams ir valikliams, tad jas reikia saugoti nuo jų.

Norint paruošti suspensiją vakcinacijai, reikia išimti tabletę iš lizduotės ir įdėti į šaltą virintą vandenį.

Nešildykite vandens, kuriame atskiasta vakcina. Nenaudokite tablečių iš pažeistų lizduotės vietų.

Būtina įsitikinti, kad tabletė visiškai išsisklaidė, palaukti 1-2 min. Po to lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinos homogeniškumas.

Paruošta vakcina yra beveik skaidri, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai smulkiomis dalelėmis ir mažais burbuliukais paviršiuje. Nenaudokite vakcinos, jeigu pastebite, kad visa liofilizuota „tabletė“ paruošiant nėra visiškai ištirpusi arba visiškai neištirpusi, arba ji netinkamai atrodo, pvz., pakito jos spalva arba ji atrodo išbrinkusi.

Vakcinavimas su geriamu vandeniu

Suduodant vakciną su geriamu vandeniu, rekomenduotina reikiamą skaičių tablečių ištirpinti 1/5 vandens, kurį paprastai paukščiai išgeria per dieną (tikslus vandens kiekis priklauso nuo paukščių rūšies, amžiaus ir oro sąlygų). Norint neutralizuoti chlorą geriamajame vandenyje, reikia naudoti komercinį chloro neutralizatorių pagal instrukciją arba įpilti 50 ml nugriebto pieno arba 5 g nugriebto pieno miltelių į 1 litrą vandens. Įpylus nugriebto pieno, reikia palaukti 5 min ir tik tada dėti vakcinos tabletes.

Rekomendacijos dėl tinkamo vartojimo geriamajame vandenyje

Kad išvengtumėte bet kokios sąveikos, reikia nustoti apdoroti ir dezinfekuoti geriamąjį vandenį 24 valandos prieš vakcinavimą (kai vakcina duodama su vandeniu).

Rekomenduotina paukščius vakcinuoti ryte.

Būtinai užtikrinti, kad užtektų girdyklų ir visi paukščiai gautų vandens tuo pačiu metu ir išgertų vandenį su vakcina per 2-3 val.

Vanduo ir girdyklos turi būti švarios, juose neturi būti dezinfekantų likučių.

2 val. iki vakcinacijos reikia nutraukti vandens tiekimą.

Negalima pradėti tiekti vandens paukščiams, kol visa vakcina nesuvartota.

Vakcinavimas lašinant į akį (naudojimui į akį)

Tabletės turi būti skiestos vėsiamame virintame vandenyje santykiu: 1 tabletė (1000 dozių) skiedžiama 30-50 ml vandens (tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo).

Vakcina prieš vakcinaciją turi būti gerai išmaišyta. Lašintuvu reikia įlašinti paukščiui 1 lašą į akį.

Vakcinavimas purškiant

Purškimas stambiais lašais: purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau; lašai neturi būti mažesni nei 100 µm.

Kiekvienas naudojamas purkštuvus turi būti patikrintas, per kiek laiko išpurškia rekomenduotą vandens kiekį.

Aerolis: šis metodas nerekomenduotinas paukščiams iki 2 sav. amžiaus; šis būdas taikytinas tik antrai vakcinacijai.

Elektriniu ar ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40-100 µm dydžio.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

Dozių skaičius	Purškimas stambiais lašais*	Aerolis *	Lašinimas į akį**
1000	50-300	100-150	30-50
2000	100-600	200-300	60-100
2500	125-750	250-375	75-125
5000	250-1500	500-750	150-250
10000	500-3000	1000-1500	300-500

* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato išeigos: purškimas stambiais lašais ar smulkiais lašais.

** Tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo.

Rekomendacijos dėl tinkamo vartojimo purškiant

Prietaiso, naudojamo stambiais lašams arba aeroliui, efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją.

Purkštuvai ir aerolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60-70 cm atstumu.

Lašeliai turi kristi lėtai; todėl ventiliatorius reikia išjungti 20-30 min.

Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir užtikrinti ramybę vakcinacijos metu ir po jos.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Nustatyta, kad vakcina buvo saugi vienadieniams SPF viščiukams, įlašinus 0,05 ml į akį (atitinka 10 dozių).

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinį ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Pagal nacionalinius reikalavimus šiam vaistui gali būti privalomas oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

QI01AD06, QI01CD.

Vakcina yra gyva nuo Niukaslų ligos, kurios sudėtyje yra lentogeninės V.H. padermės virusų (ICPI (intracerebrinis patogeniškumo indeksas) - 0,15) su antigeninėmis savybėmis, kurios panašios į La Sota padermės, bet yra mažesnio patogeniškumo (panašūs į Hitchner B1 padermės). Virusai kultivuojami apvaisintuose kiaušiniuose iš SPF pulkų.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šios vakcinų negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę: sunaudoti nedelsiant.

Tinkamumo laikas, paruošus pagal nurodymus: sunaudoti nedelsiant.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2 – 8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Aluminiinės lizduotės po 5 ar 10 tablečių, kuriose yra po 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 ar 10 000 dozių, kartoninėse dėžutėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Phibro Animal Health (Poland) Sp. z o.o.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1827/001-014

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2008-12-29

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-05-29

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic V.H., šnypščioji tabletė

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje dozėje yra: lentogeninių V.H. padermės Niukaslų ligos virusų $\geq 10^{6,0}$ EID₅₀.

3. PAKUOTĖS DYDIS

5 (10) x 100 (500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10 000) d

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.



5. INDIKACIJA (-OS)

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Geriamajame vandenyje, į akis, purškiant

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 dienų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Paruošus sunaudoti nedelsiant.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti šaldytuve

Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1827/001
LT/2/08/1827/002
LT/2/08/1827/003
LT/2/08/1827/004
LT/2/08/1827/005
LT/2/08/1827/006
LT/2/08/1827/007
LT/2/08/1827/008
LT/2/08/1827/009
LT/2/08/1827/010
LT/2/08/1827/011
LT/2/08/1827/012
LT/2/08/1827/013
LT/2/08/1827/014

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**Lizduotė****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Tabic V.H.

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJANDV, padermė V.H. $\geq 10^{6,0}$ EID₅₀**3. SERIJOS NUMERIS**

Lot

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Paruošus sunaudoti nedelsiant.

Papildoma informacija:

100 (500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10 000) d

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

TAbic V.H., šnypščioji tabletė vištoms ir kalakutams

2. Sudėtis

Kiekvienoje dozėje yra:

lentogeninių V.H. padermės Niukaslo ligos virusų – ne mažiau kaip $10^{6,0}$ EID₅₀*

* EID₅₀ infekcinė dozė 50 % kiaušinių (Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuris, kaip numatoma, užkrės 50 procentų apvaisintų kiaušinių, į kuriuos yra inokuluotas).

Apskrita balkšva (beveik kreminė) šnypščioji tabletė.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.



4. Naudojimo indikacijos

Aktyviam vištų ir kalakutų vakcinavimui nuo Niukaslo ligos.

Imuniteto pradžia: Po pirmos vakcinacijos imunitetas pasireiškia praėjus 5 dienoms, bet visas imunitetas susidaro praėjus 2 sav. po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė : 2 mėnesiai.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus, nepaveiktus streso veiksnių, tokių kaip perpildymas, peršildymas, šaltis, nepakankamas šėrimas ir kt.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Netaikoma.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai pavartojus, prarijus, patekus ant odos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Vakcina gali sukelti vakcinuojantiems žmonėms nedidelį konjunktyvitą, kuris gali trukti 2-3 dienas, tad apsaugokite akis nuo tiesioginio sąlyčio su vakcina. Naudojant šią vakciną būtinos asmeninės apsaugos priemonės, (apsauginiai akiniai ir kaukės).

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Nustatyta, kad vakcina yra saugi vienos dienos amžiaus SPF (angl. *specific pathogen free* – be specifinio patogeno) viščiukams, lašinant į akį 0,05 ml (tai atitinka 10 dozių).

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos

Pagal nacionalinius reikalavimus šiam vaistui gali būti privalomas oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Nepastebėta.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Šią vakciną galima naudoti su geriamuoju vandeniu, infuzija į akį arba purškiant stambiais lašais arba aerozoliu.

Norint gauti gerus rezultatus ir užtikrinti pilną paukščių apsaugą per visą jų augimo periodą iki pat skerdimo (7-8 savaites) bei tėvinius pulkus ir dedekles kiaušinių dėjimo metu, rekomenduotina vakcinuoti viščiukus du kartus, 1-mą ir 17-tą amžiaus dieną.

Būtina tinkamai dozuoti (negalima gerti mažiau, geriau perdozuoti, nes vakcina nėra žalinga).

Gyvos vakcinos yra jautrios orui, saulės šviesai, karščiui, dezinfekantams ir valikliams, tad jas reikia saugoti nuo jų.

Norint paruošti suspensiją vakcinacijai, reikia išimti tabletę iš lizduotės ir įdėti į šaltą virintą vandenį. Būtina įsitikinti, kad tabletė visiškai išsisklaidė, palaukti 1-2 min. Po to lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinos homogeniškumas. Nešildykite vandens, kuriame atskieta vakcina. Nenaudokite tablečių iš pažeistų lizduotės vietų.

Paruoša vakcina yra beveik skaidri, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai smulkiomis dalelėmis ir mažais burbuliukais paviršiuje.

Nenaudokite vakcinos, jeigu pastebite, kad visa liofilizuota „tabletė“ paruošiant nėra visiškai ištirpusi arba visiškai neištirpusi, arba ji netinkamai atrodo, pvz., pakito jos spalva arba ji atrodo išbrinkusi.

Vakcinavimas su geriamu vandeniu

Suduodant vakciną su geriamu vandeniu, rekomenduotina reikiamą skaičių tablečių ištirpinti 1/5 vandens, kurį paprastai paukščiai išgeria per dieną (tikslus vandens kiekis priklauso nuo paukščių rūšies, amžiaus ir oro sąlygų). Norint neutralizuoti chlorą geriamajame vandenyje, reikia naudoti komercinį chloro neutralizatorių pagal instrukciją arba įpilti 50 ml nugriebto pieno arba 5 g nugriebto

pieno miltelių į 1 litrą vandens. Įpylus nugriebto pieno, reikia palaukti 5 min ir tik tada dėti vakcinos tabletes.

Vakcinavimas lašinant į akį (naudojimui į akį)

Tabletės turi būti skiestos vėsiamame virintame vandenyje santykiu: 1 tabletė (1000 dozių) skiedžiama 30-50 ml vandens (tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo).

Vakcina prieš vakcinaciją turi būti gerai išmaišyta. Lašintuvu reikia įlašinti paukščiui 1 lašą į akį.

Vakcinavimas purškiant

Purškimas stambiais lašais: purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau; lašai neturi būti mažesni nei 100 µm.

Kiekvienas naudojamas purkštuvus turi būti patikrintas, per kiek laiko išpurškia rekomenduotiną vandens kiekį.

Aerolis: šis metodas nerekomenduotinas paukščiams iki 2 sav. amžiaus; šis būdas taikytinas tik antrai vakcinacijai.

Elektriniu ar ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40-100 µm dydžio.

Elektriniu ar ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40-100 µm dydžio.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

Dozių skaičius	Purškimas stambiais lašais*	Aerolis*	Lašinimas į akį**
1000	50-300	100-150	30-50
2000	100-600	200-300	60-100
2500	125-750	250-375	75-125
5000	250-1500	500-750	150-250
10000	500-3000	1000-1500	300-500

* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato išeigos: purškimas stambiais lašais ar smulkiais lašais.

** Tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Rekomendacijos dėl tinkamo vartojimo geriamajame vandenyje

Kad išvengtumėte bet kokios sąveikos, reikia nustoti apdoroti ir dezinfekuoti geriamąjį vandenį 24 valandos prieš vakcinavimą (kai vakcina duodama su vandeniu).

Rekomenduotina paukščius vakcinuoti ryte.

Būtinai užtikrinti, kad užtektų girdyklų ir visi paukščiai gautų vandens tuo pačiu metu ir išgertų vandenį su vakcina per 2-3 val.

Vanduo ir girdyklos turi būti švarios, juose neturi būti dezinfekantų likučių.

2 val. iki vakcinacijos reikia nutraukti vandens tiekimą.

Negalima pradėti tiekti vandens paukščiams, kol visa vakcina nesuvartota.

Rekomendacijos dėl tinkamo vartojimo purškiant

Prietaiso, naudojamo stambiais lašams arba aeroliui, efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją.

Purkštuvai ir aerolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60-70 cm atstumu.

Lašeliai turi kristi lėtai; todėl ventiliatorius reikia išjungti 20-30 min.

Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir užtikrinti ramybę vakcinacijos metu ir po jos.

10. Išlauka

0 dienų

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2 – 8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizdinės plokštelės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę: sunaudoti nedelsiant.

Tinkamumo laikas, paruošus pagal nurodymus: sunaudoti nedelsiant.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/08/1827/001-014

Aliumininės lizduotės, kuriose yra po 5 arba 10 tablečių su 100, 500, 1 000, 2 000, 2 500, 5 000 arba 10 000 dozėmis, kartoninėse dėžutėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-05-29

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

Phibro Animal Health (Poland) Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Lenkija

El. paštas: pv.polska@pahc.com

Tel.: +48 607 380 360

Gamintojas atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 15
62-020 Swarzędz
Lenkija

17. Kita informacija

Vakcina yra gyva nuo Niukaslo ligos, kurios sudėtyje yra lentogeninės V.H. padermės virusų (ICPI (intracerebrinis patogeniškumo indeksas) - 0,15) su antigeninėmis savybėmis, kurios panašios į La Sota padermės, bet yra mažesnio patogeniškumo (panašūs į Hitchner B1 padermės). Virusai kultivuojami apvaisintuose kiaušiniuose iš SPF pulkų.
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.