

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/03/1559

Nobilis TRT inac. emulsija injekcijām vistām un tītariem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International B.V.

Wim de Kórverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis TRT inac. emulsija injekcijām vistām un tītariem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (0,5 ml) satur:

Aktīvā viela:

Putnu rinotraheīta vīrusa (ARTV) celms But1#8544, kas ierosina $\geq 10 \log_2$ ELISA vienības.

Adjuvants:

Šķidrās parafīns: 215 mg.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vaislas un dējējvistu un vaislas tītaru ganāmpulka aktīvai imunizācijai, lai samazinātu mirstību un klīniskos simptomus (t.sk. dējības kritumu), ko ierosina putnu rinotraheīta vīrusa infekcija.

Imunātes iestāšanās: 4 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: viens dēšanas periods.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācijas vietā var novērot vieglu īslaicīgu pietūkumu līdz 2 nedēļām.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (vaislas un dējējvistas), tītari (vaislas).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Vakcinēt vistas aptuveni 14-20 nedēļu vecumā un tītarus aptuveni 28 nedēļu vecumā, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms plānotā dēšanas perioda sākuma.

Katram putnam ievadīt vienu devu 0,5 ml vakcīnas, injicējot intramuskulāri ciskas vai krūšu muskulī vai subkutāni kakla lejasdaļā.

Lai iegūtu pietiekamu aizsardzību, ieteicams vistas un tītarus sākotnēji vakcinēt ar dzīvo vakcīnu pret putnu rinotraheītu. Vislabākie rezultāti tiks iegūti, ja vakcinācija ar inaktivēto vakcīnu notiks vismaz 4 nedēļas pēc primārās dzīvu vīrusu vakcīnas ievadīšanas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms vakcinācijas ļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 °C).

Pirms lietošanas un periodiski lietošanas laikā spēcīgi saskalināt pudeli.

Lietot sterilu vakcinācijas aprīkojumu.

Neizmantojot vakcinācijas aprīkojumu ar gumijas daļām, jo palīgvielas var bojāt noteikta tipa gumiju.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Izlietot visu saturu 3 stundu laikā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un/vai vismaz 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav novērojama mijiedarbība pēc vienlaicīgas Nobilis TRT inac. esošā ARTV antigēna ievadīšanas kopā ar citiem Intervet ražoto vīrusu vai baktēriju vakcīnu antigēniem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nav ievērojamu simptomu pēc dubultas devas ievadīšanas. Vakcinācijas vietā var novērot vieglu īslaicīgu pietūkumu līdz 2 nedēļām.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģisko produktu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

05/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.