

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0447

Hierrodexina

Šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barselona), Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hierrodexina

Šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Aktīvās vielas:

Dzelzs polisaharīds 100 mg

Kobalta hlorīds 4 µg

Ciānkobalamīns 25 µg

Palīgviela:

Ūdens injekcijām līdz 1 ml

Hierrodexina ir sarkanīgi brūns homogēns šķīdums bez suspendētām daļiņām.

4. INDIKĀCIJA(AS)

Dzelzs deficīta izraisītas hipohromās anēmijas ārstēšanai, īpaši sivēnu anēmijas ārstēšanai. Rezistences pret mikrobu slimībām (pneimoniya, diareja u.c.) palielināšanai. Lietojams grūsnības laikā, atveseļošanās laikā, pret liellopu pirop plazmozi un kā vispārējs tonizējošs līdzeklis.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Sivēni: Profilakse: 1-2 ml no 2. līdz 4. dienai pēc dzimšanas. Ārstēšana: 2 ml pēc pirmajiem anēmijas simptomiem vai starp 7. un 21. dienu pēc dzimšanas.

Liellopi: Pieaugušie īpatņi: 5-10 ml; Teļi: 3 ml.

Aitas: Pieaugušie īpatņi: 3-5 ml; Jēri: 1 ml.

Zāles ievada dziļas intramuskulāras injekcijas veidā pakājkājas muskulī. Lai novērstu noplūdi injekcijas vietā, pirms adatas ievadīšanas zemādas audus pavelk sāņus.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma /uz pudeles pēc “Derīgs līdz:”.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

2010. gada 23. februāris

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles

Hierrodexina ir sterils šķīdums, kas satur dzelzs polisaharīdu, kobaltu un B₁₂ vitamīnu, ko lieto anēmijas ārstēšanā dzīvniekiem, īpaši dzelzs deficīta anēmijas ārstēšanā sivēniem, ja sivēnmāšu piens nenodrošina sivēnu normālai attīstībai un hemoglobīna veidošanai nepieciešamo dzelzi.

Hierrodexina novērš vai ārstē dzelzs deficīta anēmiju sivēniem un dzīvniekiem kopumā, palielina organisma aizsargspējas pret infekcijām, palielina pieauguma indeksu un uzlabo to attīstību.

Iepakojuma izmēri: 50 ml un 100ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo tirdzniecības pārstāvi Latvijā:

Dimela Veta Latvija AS, “Ezīši”, Mārupes pagasts, Rīgas raj. LV-2166, tel. 67610001