

## ЕТИКЕТИ

### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

#### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

MACROTYL-300, 300 mg/ml инжекционен разтвор

#### 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tilmicosin (като phosphate) 300 mg/ml

#### 3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml

100 ml

#### 4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

#### 5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

##### Говеда

Лечение на респираторна болест по говедата, свързана с *Mannheimia haemolytica* и *Pasteurella multocida*.

Лечение на интердигитална некробацилоза (пододерматит).

##### Овце

Лечение на инфекции на респираторния тракт, причинена от *Mannheimia haemolytica* и *Pasteurella multocida*.

Лечение на инфекциозен пододерматит, причинен от *Dichelobacter nodosus* и *Fusobacterium necrophorum*.

Лечение на остър мастит, причинен от *Staphylococcus aureus* и *Mycoplasma agalactiae*.

#### 6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

САМО ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

#### 7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 70 дни

Мляко: 36 дни.

Ако продуктът се приложи на крави през сухостойния период или на бременни юници за мляко, млякото не трябва да се консумира от хора до 36 дни след отелването.

Овце:

Месо и вътрешни органи: 42 дни.

Мляко: 18 дни.

Ако продуктът се приложи на овце през сухостойния период или на бременни овце за мляко, млякото не трябва да се консумира от хора до 18 дни след раждането.

|                           |
|---------------------------|
| <b>8. СРОК НА ГОДНОСТ</b> |
|---------------------------|

Ехр.: {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ</b> |
|-------------------------------------------|

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“</b> |
|-----------------------------------------------------------|

Преди употреба прочетете листовката.

„ИНЖЕКТИРАНЕТО НА ТИЛМИКОЗИН ПРИ ХОРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ФАТАЛНО - БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЛУЧАЙНО САМОИНЖЕКТИРАНЕ И СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ.“

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”</b> |
|--------------------------------------------------------------|

Само за ветеринарномедицинска употреба.

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ</b> |
|-----------------------------------------------------------|

Interchemie werken „De Adelaar” B.V.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ</b> |
|-----------------------------------------------|

0022-2039

|                           |
|---------------------------|
| <b>15. ПАРТИДЕН НОМЕР</b> |
|---------------------------|

Lot: {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА  
ОПАКОВКА**

Стъклени флакони от 50 ml и 100 ml

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

MACROTYL-300, 300 mg/ml инжекционен разтвор

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Tilmicosin (като phosphate) 300 mg/ml

**3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Говеда и овце.

**4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

САМО ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Преди употреба прочетете листовката.

„ИНЖЕКТИРАНЕТО НА ТИЛМИКОЗИН ПРИ ХОРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ФАТАЛНО - БЪДЕТЕ  
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЛУЧАЙНО САМОИНЖЕКТИРАНЕ  
И СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ.”

**5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 70 дни

Мляко: 36 дни.

Ако продуктът се приложи на крави през сухостойния период или на бременни юници за мляко,  
млякото не трябва да се консумира от хора до 36 дни след отелването.

Овце:

Месо и вътрешни органи: 42 дни.

Мляко: 18 дни.

Ако продуктът се приложи на овце през сухостойния период или на бременни овце за мляко,  
млякото не трябва да се консумира от хора до 18 дни след раждането.

**6. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр.: {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

**7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ</b> |
|----------------------------------------------------------|

Interchemie werken „De Adelaar” B.V.

|                          |
|--------------------------|
| <b>9. ПАРТИДЕН НОМЕР</b> |
|--------------------------|

Lot {номер}

13.10.2025 г.

X

---

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП  
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV