

ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/05/1231

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

Permetrīns 400 mg

Piriproksifēns 3 mg

Palīgviela(-s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Suņi

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu un ērcu invāzijas ārstēšana un profilakse suņiem.

Blusu iznīcināšanai.

Jaunas pieaugušu blusu invāzijas profilaksei līdz 4 nedēļām.

Blusu vairošanās ierobežošanai līdz 8 nedēļām, inhibējot nenobriedušu blusu attīstību līdz pieaugušu blusu stadijai.

Pret ērcēm:

Invāzijas profilaksei 4 nedēļu garumā.

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem.

Nelietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Tā kā nav pieejamu datu, Duowin contact nedrīkst lietot kucēniem līdz 2 mēnešu vecumam, kā arī suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg.

4.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tikai ārīgai lietošanai.

Pēc Duowin contact aplikācijas 48 stundas izvairīties no dzīvnieka saskarsmes ar ūdeni (mazgāšana vai peldes).

Lai pēc Duowin contact aplikācijas samazinātu iespējamās blakusparādības (vemšana, siekalošanās), jānovērš dzīvnieka pārmērīga laizīšanās.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no produkta saskarsmes ar ādu un acīm. Pēc šķīduma aplikācijas mazgāt rokas, īpaši ja tas nokļuvis uz lietotāja ādas. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem un dzērieniem.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Dažiem dzīvniekiem pēc Duowin contact šķīduma aplikācijas iespējama pastiprināta siekalošanās, vemšana un nieze. Šīs blakusparādības galvenokārt ir viegli izteiktas un pārejošas.

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav noteikts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

4.8. Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā nav pieejami dati, Duowin contact terapijas laikā nav ieteicams lietot citus insekticīdus.

4.9. Devas un lietošanas veids

Šķīdums paredzēts pilināšanai uz ādas.

Rekomendējamā minimālā deva ir 106 mg perimetrīna un 0,8 mg piriproksifēna / kg ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu šādu devu, lietojiet maziem suņiem ar ķermeņa svaru līdz 7,5 kg vienu 2 ml pipeti.

Turiet pipeti vertikāli. Izņemiet vāciņu. Apgrieziet ar augšdaļu uz leju un, sākot no pamatnes, spiediet tūbiņu, turot pipeti saskarē ar ādu.

Duowin contact aplicēt tieši uz ādas pa dzīvnieka muguras līniju — no astes pamatnes līdz kakla daļas skaustam.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Suņiem ir laba tolerance pret šīm zālēm, lietojot pat tādu devu, kas 5 reizes pārsniedz ieteikto. Tūlītējas vai novēlotas blakusparādības nav novērotas.

Ja tomēr rodas jebkādas blakusparādību pazīmes (hiperestēzija, ataksija, intensīva eritēma, pastāvīgs tremors), lai pārtrauktu šo zāļu iedarbību, ieteicams mazgāt suni ar šampūnu.

4.11. Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Ektoparazīticīdi vietējai lietošanai, perimetrīns kombinācijās, ATKvet kods: QP53AC54.

Duowin contact ir insekticīds šķīdums lietošanai uz ādas, kas satur šādu vielu kombināciju.

- Pieaugušos insektus iznīcinoša aktīvā viela: permetrīns, kas ir spēcīgas iedarbības insekticīds (piemēram, pret blusām) un akaricīds (piemēram, pret ērcēm).
- Aktīvā viela ar ovicīdu un larvicīdu iedarbību: piriproksifēns, kas inhibē parazītu olīņu un kāpuru attīstību.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Permetrīns ir sintētisks piretroīds, kas ātri likvidē pieaugušas blusas un ērces, bloķējot nervu impulsu pārvadi insektu un ērcu organismā. Turklāt permetrīnam piemīt ļoti strauja blusas iznīcinošā iedarbība. Šie efekti ir saistīti ar laika un koncentrācijas izmaiņām, Na^+ un K^+ joniem šķērsojot aksonu membrānas to darbības potenciāla laikā.

Piriproksifēns ir insektu augšanas regulators (IAR), kas inhibē parazītu olīņu un kāpuru attīstību, novēršot jaunās paaudzes pieaugušu blusu parādīšanos.

5.2. Farmakokinētiskie dati

Duowin contact ir paredzēts tikai lokālai aplikācijai. Pēc aplikācijas Duowin contact aktīvās vielas izplatās dzīvnieka ādā un apspalvojumā, nodrošinot pretktoparazītāru iedarbību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Butilhidroksianizols
Butilhidroksitoluols
Dietilēnglikola monoetilēteris

6.2. Nesaderība

Nav noteikta.

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 24 mēneši.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Vienas devas plastikāta pipetes no augsta blīvuma polietilēna ar termiski blīvētu vāciņu, kuras satur 2 ml.
Kārbiņās pa 4 pipetēm.

6.6. Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārajām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Duowin contact nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Virbac S.A.
1ère avenue-L.I.D.-2065 m
06516 Carros
Francija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/05/1231

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

09/2005
04/2011

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2011

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.