

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1545

Marbocyl 2% 20 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.,

13-14 Kosynierow Gdynskich st.,

66-400 Gorzów Wlkp.,

Polija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl 2% 20 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Marbofloxacinum

3. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Marbofloksacīns 20,0 mg

Palīgvielas:

Dinātrija edetāts 0,1 mg

Tioglicerols 0,5 mg

m-krezols 2,0 mg

4. INDIKĀCIJA(AS)

Tēliem un jaunlopiem

Pasteurella multocida, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* un *Mycoplasma bovis* izraisītu respiratoru infekciju ārstēšanai.

Cūkām

Actinobacillus pleuropneumoniae, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* jutīgu celmu izraisītu respiratoru infekciju ārstēšanai.

Veterinārās zāles drīkst lietot tikai pamatojoties uz jutīguma testu rezultātiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pie bakteriālas infekcijas ar zināmu rezistenci pret citiem fluorohinoloniem .
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret marbofloksacīnu vai citiem hinoloniem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Subkutāna vai intramuskulāra ievadīšana var radīt īslaicīgu tūsku.

Intramuskulāra ievadīšana var izraisīt sāpes un iekaisumu injekcijas vietā. Iekaisums var ilgt līdz 6 dienām cūkām un 12 dienām teļiem.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un nobarojamās cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Teliem un jaunlopiem

Ieteicamā deva ir 2 mg/kg/dienā (1 ml/10 kg), injicē subkutāni vai intramuskulāri vienreiz dienā 3-5 dienas pēc kārtas. Pirmo devu var ievadīt arī intravenozi.

Cūkām

Respiratoro infekciju ārstēšanai: ieteicamā deva ir 2 mg/kg (1 ml/ 10 kg ķermeņa svara), injicē intramuskulāri vienreiz dienā 3-5 dienas pēc kārtas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem.

Fluorohinoloni jālieto tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuri vāji pakļaujas vai sagaidāms, ka tie vāji pakļausies ārstēšanai ar citas klases antibiotikām.

Kad vien iespējams, fluorohinoloni jālieto tikai pamatojoties uz jutīguma pārbaudes rezultātiem, lietojot veterinārās zāles jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Lietojojot veterinārās zāles, novirzīšanās no zāļu aprakstā dotajām instrukcijām var paaugstināt baktēriju rezistenci pret fluorohinoloniem un var samazināt ārstēšanas efektivitāti ar citiem hinoloniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ.

Iedarbības dati parādīja nepietiekamu produkta iedarbību grampozitīvu celmu izraisītu akūtu mastītu ārstēšanai.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2012

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Lietošanai dzīvniekiem