

MARKĒJUMS – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Šīm veterinārajām zālēm nav atsevišķa lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz marķējuma

V/DCP/13/0051

Zuritol 50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

Les Franqueses del Vallès, (Barselona)

Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zuritol 50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai cūkām

Toltrazuril

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Toltrazurils 50 mg

Palīgvielas:

Nātrija benzoāts (E 211)..... 2,1 mg

Nātrija propionāts (E 281)..... 2,1 mg

Suspensija iekšķīgai lietošanai baltā vai dzeltenīgā krāsā.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Kokcidiozes klīnisko pazīmju novēršanai jaundzimušiem sivēniem (3–5 dienas veciem) novietnēs, kurās ir konstatēta *Isoospora suis* izraisīta kokcidioze.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (3 – 5 dienas veci sivēni).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKA SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Atsevišķu dzīvnieku ārstēšanai.

Ārstē katru sivēnu 3.–5. dzīves dienā ar vienu iekšķīgi lietojamu 20 mg toltrazurila devu uz vienu kg ķermeņa svara, kas atbilst 0,4 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai uz vienu kg ķermeņa svara.

Tā kā viena sivēna ārstēšanai ir nepieciešama neliela deva, ieteicams izmantot dozēšanas ierīci ar devas precizitāti līdz 0,1 ml.

Pirms lietošanas suspensija iekšķīgai lietošanai ir jāsakalina.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Slimības uzliesmojuma laikā atsevišķu sivēnu ārstēšanas rezultāts var būt mazāk efektīvs, sakarā ar tievo zarnu bojājumiem.

Pirms zāļu lietošanas precīzi jānosaka dzīvnieku svars.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 77 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Kā jebkura pretparazītāra līdzekļa lietošanas gadījumā, pēc biežas un atkārtotas tās pašas klases līdzekļu pret parazitāriem viensūņiem lietošanas var veidoties rezistence.

Ieteicams ārstēt visus viena metiena sivēnus.

Higiēnas pasākumu ievērošana var samazināt kokcidiozes risku. Tāpēc ieteicams vienlaicīgi uzlabot higiēnas apstākļus attiecīgajā novietnē, jo īpaši nodrošinot sausumu un tīrību.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, dzīvnieki jāārstē pirms klīnisko pazīmju parādīšanās, t.i., preklīniskajā periodā.

Izmainoties kokcidiozes invāzijas gaitai, kad atsevišķiem dzīvniekiem jau parādījušās diarejas pazīmes, nepieciešama papildus uzturošā terapija.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu vai kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm veterinārajām zālēm.

Zāles var izraisīt kairinājumu, ja tas nonāk saskarē ar ādu vai acīm.

Izvairīties no šo zāļu saskares ar ādu un acīm^[1]_{SEP}

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas.

Jebkādu šo zāļu daudzumu, kas nokļuvis uz ādas vai acīs, nekavējoties noskalot ar ūdeni.

Lietojot šīs veterinārās zāles, neēst, nedzert un nesmēķēt.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma, piemēram, nav mijiedarbības savienojumā ar dzelzs piedevām.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Trīskārša šo zāļu pārdozēšana sīvēniem nerada nepanesības pazīmes.^[1]_{SEP}

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lietošanai dzīvniekiem.

Reģistrācijas numurs:

V/DCP/13/0051

Lot {numurs}

EXP {mēnesis/gads}

250 ml flakons

1000 ml flakons