

**I PIELIKUMS**  
**VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS**

## 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ReproCyc ParvoFLEX suspensija injekcijām cūkām

## 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra deva (2 ml) satur:

### Aktīvā viela:

Cūku parvovīruss, celma 27a VP2 proteīns, RP\*  $\geq$  1,0

\* Relatīvā potence (ELISA)

### Adjuvants:

Karbomērs 2 mg

### Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs
Nātrija hlorīds
Ūdens injekcijām
Kālija hlorīds
Kālija dihidrogēnfosfāts
Nātrija hidrogēnfosfāts, bezūdens

Bezkrāsaina līdz gaiši brūna, opalescējoša suspensija.

## 3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

### 3.1. Mērķsugas

Cūkas.

### 3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Jaununcūku un sivēnmāšu aktīvai imunizācijai no 5 mēnešu vecuma, lai aizsargātu pēcnācējus pret cūku parvovīrusa izraisītu transplacentāru infekciju.

Imunitātes iestāšanās: no grūsnības perioda sākuma.

Imunitātes ilgums: 6 mēneši.

### 3.3. Kontrindikācijas

Nav.

### 3.4. Īpaši brīdinājumi

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

### 3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Nav piemērojami.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Nav piemērojami.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

### 3.6. Blakusparādības

Cūkas:

Ļoti bieži (>1 dzīvniekam/10 ārstētajiem dzīvniekiem):	Pietūkums injekcijas vietā <sup>1</sup> , apsārtums injekcijas vietā <sup>1</sup>
Bieži (1 līdz 10 dzīvniekiem/100 ārstētajiem dzīvniekiem):	Paaugstināta ķermeņa temperatūra <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Izzūd 2 līdz 5 dienu laikā bez ārstēšanas.

<sup>2</sup> Izzūd spontāni 24 līdz 48 stundu laikā.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

### 3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

### 3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pieejamie drošuma un iedarbīguma pētījumi pierāda, ka šo vakcīnu drīkst lietot maisījumā ar ReproCyc PRRS EU un ievadīt vienā injekcijas vietā.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot iepriekš minētajām. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņemt, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

### 3.9. Lietošanas veids un devas

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Lietošanas laikā izvairīties no kontaminācijas.

Primārās vakcinācijas shēma:

Cūkām, kuras iepriekš nav vakcinētas pret cūku parvovīrusu:

Divas vienas devas intramuskulāras injekcijas ar 3 nedēļu intervālu.

Otro devu ievadīt ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms pārošanas.

Revakcinācijas shēma:

Ieteicama visa ganāmpulka vakcinācija ar vienu devu, intramuskulāras injekcijas veidā, ne retāk kā reizi 6 mēnešos (skatīt 3.2. apakšpunktā).

Lietošana maisījumā ar ReproCyc PRRS EU:

Lai izšķīdinātu liofilizātu vienā ReproCyc PRRS EU flakonā, nepieciešams izmantot visu viena ReproCyc ParvoFLEX flakona saturu. ReproCyc ParvoFLEX tādējādi aizstāj ReproCyc PRRS EU šķīdinātāju.

Pirms lietošanas pārlicināties, ka liofilizāts ir pilnībā izšķīdis.

Intramuskulāri ievadīt vienu devu (2 ml) vakcīnu maisījumā.

Var lietot maisījumā, izmantojot šādus atbilstošos vakcīnas iepakojumus (devas):

<b>ReproCyc ParvoFLEX</b>	<b>ReproCyc PRRS EU (liofilizāts)</b>
10 devas (20 ml)	10 devas
50 devas (100 ml)	50 devas
100 devas (200 ml)	100 devas

Pirms veterināro zāļu lietošanas maisījumā, skatīt arī ReproCyc PRRS EU lietošanas instrukciju.

### **3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)**

Dati nav pieejami.

### **3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku**

Nav piemērojami.

### **3.12. Ierobežojumu periods**

Nulle dienas.

## **4. IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS**

### **4.1. ATŅvet kods: QI09AA02**

Vakcīna paredzēta cūkām, lai stimulētu aktīvās imunitātes veidošanos pret parvovīrusu.

## **5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA**

### **5.1. Būtiska nesaderība**

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot ar ReproCyc PRRS EU.

### **5.2. Derīguma termiņš**

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā:	2 gadi.
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas:	8 stundas.
Derīguma termiņš pēc sajaukšanas ar ReproCyc PRRS EU:	8 stundas.

### **5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt pudelī ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

### **5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs**

Augsta blīvuma polietilēna pudeles ar 20 ml (10 devas), 100 ml (50 devas) un 200 ml (100 devas).  
Katra pudele ir noslēgta ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Kartona kastē 1 pudele ar 20 ml (10 devas), vai 100 ml (50 devas), vai 200 ml (100 devas).  
Kartona kastē 12 pudeles ar 20 ml (12 x 10 devas) vai 100 ml (12 x 50 devas), vai 200 ml (12 x 100 devas).

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

#### **5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

#### **6. TIRDZNICĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

#### **7. TIRDZNICĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)**

EU/2/19/237/001-006

#### **8. PIRMĀS TIRDZNICĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS**

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: {DD/MM/GGGG}

#### **9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**

{MM/GGGG}

#### **10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **II PIELIKUMS**

**CITI TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS**  
Nav.

**III PIELIKUMS**  
**MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

## **A. MARĶĒJUMS**



## UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Kartona kastīte 20 ml, 100 ml, 200 ml pudelēm

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ReproCyc ParvoFLEX suspensija injekcijām

### 2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra deva (2 ml) satur:

Cūku parvovīrusu celma 27a VP2 proteīns: RP\*  $\geq 1,0$

\* Relatīvā potence (ELISA)

### 3. IEPAKOJUMA LIELUMS

20 ml (10 devas)

100 ml (50 devas)

200 ml (100 devas)

12 x 20 ml (12 x 10 devas)

12 x 100 ml (12 x 50 devas)

12 x 200 ml (12 x 100 devas)

### 4. MĒRĶSUGAS

Cūkas.

### 5. INDIKĀCIJAS

### 6. LIETOŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Intramuskulārai lietošanai.

### 7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

### 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {dd/mm/gggg}

Pēc caurduršanas izlietot 8 stundu laikā.

### 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”**

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.

**12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI**

EU/2/19/237/001

EU/2/19/237/002

EU/2/19/237/003

EU/2/19/237/004

EU/2/19/237/005

EU/2/19/237/006

**15. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

## UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

100 ml, 200 ml pudele

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ReproCyc ParvoFLEX suspensija injekcijām

### 2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra deva (2 ml) satur:

Cūku parvovīrusu celma 27a VP2 proteīns: RP\*  $\geq 1,0$

\* Relatīvā potence (ELISA)

100 ml (50 devas)

200 ml (100 devas)

### 3. MĒRĶSUGAS

Cūkas.

### 4. LIETOŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

i.m.

### 5. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

### 6. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {dd/mm/gggg}

Pēc caurduršanas izlietot 8 stundu laikā.

### 7. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

### 8. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS



**9. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**20 ml pudele**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

ReproCyc ParvoFLEX

**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

20 ml (10 devas)

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {dd/mm/gggg}

Pēc caurduršanas izlietot 8 stundu laikā.

## **B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## 1. Veterināro zāļu nosaukums

ReproCyc ParvoFLEX suspensija injekcijām cūkām

## 2. Sastāvs

Katra deva (2 ml) satur:

### **Aktīvā viela:**

Cūku parvovīruss, celma 27a VP2 proteīns: RP\*  $\geq$  1,0

\* Relatīvā potence (ELISA)

**Adjuvants:** Karbomērs 2 mg.

Bezkrāsaina līdz gaiši brūna, opalescējoša suspensija.

## 3. Mērķsugas

Cūkas.

## 4. Lietošanas indikācijas

Jauncūku un sivēnmāšu aktīvai imunizācijai no 5 mēnešu vecuma, lai aizsargātu pēcnācējus pret cūku parvovīrusa izraisītu transplacentāru infekciju.

Imunitātes iestāšanās: no grūsnības perioda sākuma.

Imunitātes ilgums: 6 mēneši.

## 5. Kontrindikācijas

Nav.

## 6. Īpaši brīdinājumi

### Īpaši brīdinājumi:

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

### Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Pieejamie drošuma un iedarbīguma pētījumi pierāda, ka šo vakcīnu drīkst lietot maisījumā ar ReproCyc PRRS EU un ievadīt vienā injekcijas vietā.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot iepriekš minētajām. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņemt, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

### Būtiska nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot ar ReproCyc PRRS EU.

## 7. Blakusparādības

Cūkas:

**Ļoti bieži** (>1 dzīvniekam/10 ārstētajiem dzīvniekiem):

Pietūkums injekcijas vietā<sup>1</sup>

Apsārtums injekcijas vietā<sup>1</sup>

**Bieži** (1 līdz 10 dzīvniekiem/100 ārstētajiem dzīvniekiem):

Paaugstināta ķermeņa temperatūra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Izzūd 2 līdz 5 dienu laikā bez ārstēšanas.

<sup>2</sup> Izzūd spontāni 24 līdz 48 stundu laikā.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: {informācija par nacionālo ziņošanas sistēmu}

## 8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Intramuskulārai lietošanai.

Primārās vakcinācijas shēma:

Cūkām, kuras iepriekš nav vakcinētas pret cūku parvovīrusu:

Divas vienas devas intramuskulāras injekcijas ar 3 nedēļu intervālu.

Otro devu ievadīt ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms pārošanas.

Revakcinācijas shēma:

Ieteicama visa ganāmpulka vakcinācija ar vienu devu, intramuskulāras injekcijas veidā, ne retāk kā reizi 6 mēnešos (skatīt sadaļu "Lietošanas indikācijas").

Lietošana maisījumā ar ReproCyc PRRS EU:

Lai izšķīdinātu liofilizātu vienā ReproCyc PRRS EU flakonā, nepieciešams izmantot visu viena ReproCyc ParvoFLEX flakona saturu. ReproCyc ParvoFLEX tādējādi aizstāj ReproCyc PRRS EU šķīdinātāju.

Pirms lietošanas pārlicināties, ka liofilizāts ir pilnībā izšķīdis.

Intramuskulāri ievadīt vienu devu (2 ml) vakcīnu maisījuma.

Var lietot maisījumā, izmantojot šādus atbilstošos vakcīnas iepakojumus (devas):

<b>ReproCyc ParvoFLEX</b>	<b>ReproCyc PRRS EU (liofilizāts)</b>
10 devas (20 ml)	10 devas
50 devas (100 ml)	50 devas
100 devas (200 ml)	100 devas

Pirms veterināro zāļu maisījuma lietošanas skatīt arī ReproCyc PRRS EU lietošanas instrukciju.



## **9. Ieteikumi pareizai lietošanai**

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.  
Lietošanas laikā izvairīties no kontaminācijas.

## **10. Ierobežojumu periods**

Nulle dienas.

## **11. Īpaši uzglabāšanas norādījumi**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C).  
Nesasalstēt.  
Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.  
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kartona kastītes un pudeles pēc Exp.  
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot 8 stundu laikā.

## **12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

## **13. Veterināro zāļu klasifikācija**

Recepšu veterinārās zāles.

## **14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi**

EU/2/19/237/001-006

1 pudele ar 20 ml (10 devas), 100 ml (50 devas) vai 200 ml (100 devas).  
12 pudeles ar 20 ml (10 devas), 100 ml (50 devas) vai 200 ml (100 devas).

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

## **15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta**

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **16. Kontaktinformācija:**

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Vācija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai zinotu par iespējamām blakusparādībām:

**België/Belgique/Belgien**

Boehringer Ingelheim Animal  
Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
BE-1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Lietuva**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Lietuvos filialas  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Viena, Austrija  
Tel: +370 5 2595942

**Република България**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Виена, Австрия  
Tel: +359 2 958 79 98

**Luxembourg/Luxemburg**

Boehringer Ingelheim Animal  
Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
BE-1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Česká republika**

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Purkyňova 2121/3  
CZ - 110 00, Praha 1  
Tel: +420 234 655 111

**Magyarország**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Magyarországi Fióktelep  
Lechner Ö. Fasor 10.  
HU-1095 Budapest  
Tel: +36 1 299 8900

**Danmark**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: + 45 3915 8888

**Malta**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja  
Tel: +353 1 291 3985

**Deutschland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: 0800 290 0 270

**Nederland**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Netherlands B.V.  
Basisweg 10  
NL-1043 AP Amsterdam  
Tel: +31 20 799 6950

**Eesti**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Eesti filiaal  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Viin, Austria  
Tel: +372 612 8000

**Norge**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: +47 66 85 05 70

**Ελλάδα**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**Österreich**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Wien  
Tel: +43 1 80105-6880

**España**

Boehringer Ingelheim Animal Health España,  
S.A.U.  
Prat de la Riba, 50  
ES-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34 93 404 51 00

**France**

Boehringer Ingelheim Animal Health France,  
SCS  
29, avenue Tony Garnier  
FR-69007 Lyon  
Tél : +33 4 72 72 30 00

**Hrvatska**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Beč, Austrija  
Tel: +385 1 2444 600

**Ireland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

**Ísland**

Vistor  
Hörgatún 2  
IS-210 Garðabær  
Sími: + 354 535 7000

**Italia**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Italia S.p.A.  
Via Vezza d'Oglio, 3  
IT-20139 Milano  
Tel: +39 02 53551

**Κύπρος**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**Latvija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Latvijas filiāle  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Vīne, Austrija  
Tel: +371 67 240 011

**Polska**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
PL-00-728 Warszawa  
Tel.: + 48 22 699 0 699

**Portugal**

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,  
Unipessoal, Lda.  
Avenida de Pádua, 11  
PT-1800-294 Lisboa  
Tel: +351 21 313 5300

**România**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Sucursala București  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Viena, Austria  
Tel: +40 21 302 28 00

**Slovenija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Podružnica Ljubljana  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Dunaj, Avstrija  
Tel: +386 1 586 40 00

**Slovenská republika**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co  
KG, o.z.  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
AT-1121 Viedeň, Rakúsko  
Tel: +421 2 5810 1211

**Suomi/Finland**

Vetcare Oy  
PB 99  
FI-24101 Salo  
Puh/Tel: + 358 201443360

**Sverige**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 Köpenhamn S  
Tel: +46 (0)40-23 34 00

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
DE-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

## **17. Cita informācija**

Vakcīna paredzēta cūkām, lai stimulētu aktīvās imunitātes veidošanos pret parvovīrusu.