

B. BIJSLUITER

**BIJSLUITER
PREVENDER GROTE HOND**

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VIRBAC

1ère Avenue - 2065 m L.I.D.

06516 CARROS

France

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PREVENDER GROTE HOND, halsband

Dimpylate

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per halsband:

Werkzaam bestanddeel :

Dimpylate 6,3 g (=15%)

Hulpstoffen :

Calciumcarbonaat

Calciumstearaat

Geëpoxideerde sojaolie

Di-isobutyle-adipaat

Calcium-zink complex LN 193

Poly(chloorvinyl)

Kleurstof

4. INDICATIE(S)

Curatieve en preventieve behandeling van teken- en vlooiënfestaties gedurende 150 dagen.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet toedienen aan honden jonger dan 3 maanden.

6. BIJWERKINGEN

Het dragen van de halsband veroorzaakt een verlaging van het plasmacholinesterase ; dit echter zonder gevaar voor het dier. Deze plasmawaarden verhogen zodra de halsband verwijderd wordt.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Hond

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

Een halsband per dier vanaf 20 kg gebruiken.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De halsband rond de hals van de hond bevestigen, vervolgens aanpassen zodat men twee vingers kan plaatsen tussen de halsband en de hals van de hond. Het overbodige stuk halsband voorbij de sluiting afknippen en in de vuilnisbak werpen.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het sachet na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Geen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Was de handen met water na het aanbrengen van de halsband.

- Niet roken, eten of drinken tijdens het hanteren van de halsband.

- Vermijd huidcontact

- Houd de halsband weg bij eten, drinken en diervoeding

- Voorkom dat kinderen met de band spelen of in hun mond stoppen.

- Bewaar het sachet met de halsband in de kartonnen buitenverpakking tot gebruik.

- Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. (zie paragraaf 13)

- Personen met een bekende overgevoeligheid voor dimpylate of en van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

- Niet spelen met behandelde dieren gedurende ten minste 12 uur na het omdoen van de band. De dieren dienen in de avond te worden behandeld om contact met het behandelde dieren te minimaliseren.

Op de dag van de behandeling dienen de dieren niet te slapen bij de eigenaar en zeker niet bij kinderen.

Dracht en lactatie:

Niet gebruiken tijdens de drachtperiode.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Uit voorzorgsmaatregelen is het aan te raden de halsband 24 to 48 uur voor iedere anesthesie te verwijderen. Geen andere insecticiden (organofosfaten of carbameten) gelijktijdig met de halsband gebruiken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

De symptomen van intoxicatie zijn dyspneu, overvloedige speekselafscheiding en stijfheid van de ledematen met daaropvolgend gebrek aan motorische coördinatie.

Als antidotum wordt in dit geval atropinesulfaat intraveneus of subcutaan toegediend, in een dosering van 0,1 mg/kg. Bijkomende doses kunnen toegediend worden in functie van de intoxicatieverschijnselen.

Tolerantieonderzoek, dat 11 maanden heeft geduurd, met honden die elk maximaal 5 halsbanden droegen, heeft geen gegevens naar voren gebracht die wijzen op klinische intolerantiesymptomen.

Onverenigbaarheden:

Geen

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Niet verbranden

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

September 2019

15. OVERIGE INFORMATIE

BE-V160553

Sachet met 1 halsband van 42g (ongeveer 70 cm lang).

Vrije aflevering