

Wortlaut der für das Behältnis / **die äußere Umhüllung** vorgesehenen Angaben

Karton mit 24 Euterinjektoren zu je 3 g Suspension

Gelstamp 75 mg/200 mg Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder (laktierende Milchkühe)

1 Euterinjektor Gelstamp mit 3 g Suspension enthält:

Wirkstoffe:

Ampicillin-Natrium	79,7 mg
(entsprechend 75 mg Ampicillin)	
Cloxacillin-Natrium 1 H ₂ O	218,4 mg
(entsprechend 200 mg Cloxacillin)	

Sonstige Bestandteile:

2-tert-Butyl-4-methoxyphenol	0,6 mg
------------------------------	--------

Ölige Suspension zur intramammären Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeit:

Essbare Gewebe:	3 Tage
Milch:	3 Tage

Nicht über 25°C lagern.

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zul.-Nr.: 5365.00.00

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstr. 1
10785 Berlin

Ch.-B.:
verwendbar bis:

Weitere Angaben:

Gelstamp ist mit einem variablen Spritzenaufsatz ausgerüstet.

Damit ist die Möglichkeit gegeben, eine kurze oder herkömmlich lange Kanüle auszuwählen.

Der Gebrauch einer kurzen Kanüle verhindert eine vollständige Penetration des Zitzenkanals.

Nach Möglichkeit wird diese Anwendung empfohlen.

Zur Auswahl und Anwendung der kurzen Kanüle:

Auswahl: Kappenspitze durch leichtes Biegen entfernen (siehe Abbildung). Kanüle nicht mit den Fingern berühren.

Anwendung: Nur einen Teil der Kanüle in den Strichkanal einführen (siehe Abbildung). Suspension vorsichtig durch sanften Druck auf den Kolben einspritzen.

Zur Auswahl und Anwendung der langen Kanüle:

Auswahl: Kappe unten zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen. Gesamte Kappe durch leichtes Biegen abziehen (siehe Abbildung): Kanüle nicht mit den Fingern berühren.

Anwendung: Kanüle wie gewöhnlich in den Strichkanal vorsichtig durch sanften Druck auf den Kolben einspritzen.

Gebrauchsinformation

Gelstamp 75 mg/200 mg Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder (laktierende Milchkühe)

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber:

Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstr. 1
10785 Berlin

Hersteller:

Haupt Pharma Latina S.r.l.
Strada Statale 156, km 47,6
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italien

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Gelstamp 75 mg/200 mg Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder (laktierende Milchkühe)

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 Euterinjektor mit 3 g öliger Suspension enthält:

Wirkstoffe:

Ampicillin-Natrium	79,7 mg
(entsprechend 75 mg Ampicillin)	
Cloxacillin-Natrium 1 H ₂ O	218,4 mg
(entsprechend 200 mg Cloxacillin)	

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

2-tert-Butyl-4-methoxyphenol	0,6 mg
Glyceroltris(12-hydroxyoctadecanoat)	
Erdnussöl	

Anwendungsgebiete

Zur Therapie akuter und chronischer Euterentzündungen des Rindes in der Laktationsperiode, verursacht durch *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* oder *E. coli*.

Gegenanzeigen

- Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren;
- Resistenz gegen Ampicillin, Isoxazolpenicilline, Cephalosporine;
- Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie;
- Nicht gleichzeitig mit bakteriostatisch wirkenden Antibiotika verabreichen.

Nebenwirkungen

Allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie).

Beim Auftreten einer allergischen Reaktion ist ein sofortiges Absetzen des Arzneimittels erforderlich, und die unter dem Passus "Überdosierung" genannten Gegenmaßnahmen sind zu ergreifen.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart

Rinder (laktierende Milchkühe).

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intramammären Anwendung.

Ein Euterinjektor pro infiziertes Euterviertel nach dem Ausmelken. Zwei weitere Euterinjektoren im Abstand von je 12 Stunden.

Vor der Anwendung von Gelstamp sind die Zitzen zu reinigen und zu desinfizieren. Nach dem Entfernen der Schutzkappe spritzt man den Inhalt des Euterinjektors in den Strichkanal durch Druck auf den Kolben. Nach der Anwendung sollten die Zitzen in ein geeignetes Zitzendesinfektionsmittel getaucht werden.

Siehe auch „Hinweise für die richtige Anwendung“.

Bei Mastitiden mit systemischer Symptomatik ist zusätzlich ein parenteral anzuwendendes Antibiotikum zu applizieren.

Die Anwendung der Wirkstoffkombination Ampicillin und Cloxacillin soll nur unter Berücksichtigung eines Antibiotogramms erfolgen. Dies gilt insbesondere wegen des Vorliegens hoher Resistenzraten von *E. coli* gegenüber Ampicillin.

Sollte nach 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und gegebenenfalls eine Therapieumstellung durchzuführen.

Wartezeiten

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Milch: 3 Tage.

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Die Anwendung von Gelstamp sollte unter Berücksichtigung eines Antibiotogramms erfolgen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Penicilline und Cephalosporine können allergische Reaktionen auslösen, die lebensbedrohend sein können. Deshalb sollen Personen mit bekannter Hypersensibilität gegenüber Penicillinen oder Cephalosporinen den direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Beim Auftreten allergischer Reaktionen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Die Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation ist erlaubt.

Überdosierung:

Nach Überdosierung können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungserscheinungen und Krämpfe auftreten.

Gelstamp ist sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln.

Bei Anaphylaxie: Adrenalin und Glukokortikoide i. v./i. m.

Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten.

Wechselwirkungen:

Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung.

Inkompatibilitäten:

Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Weitere Angaben

Packungsgrößen:

Packung mit 24 Euterinjektoren mit jeweils 3 g Suspension.