

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET LE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Boîte / Flacon****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

0,025 mg/ml sirop pour chevaux

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVESPar dose de 4 ml :
lenbutérol chlorhydrate**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

355 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux

5. INDICATIONS**6. VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

La dose de 0,8 µg par kg de poids corporel doit être administrée 2 fois par jour, c'est-à-dire
1 poussée de sirop/125 kg poids corporel, 2 x par jour, matin et soir.
Le sirop peut s'administrer pur ou en mélange à la nourriture.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :
Viande et abats : 28 jours (établi pour un traitement de 11 jours).
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mois/année}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V151225

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}