

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/96/0416

**Kiltix kaklasiksna maza auguma suņiem**  
**Kiltix kaklasiksna vidēja auguma suņiem**  
**Kiltix kaklasiksna liela auguma suņiem**

## 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma- und Veterinar Produkte GmbH  
Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel  
Vācija

## 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Kiltix kaklasiksna maza auguma suņiem**  
**Kiltix kaklasiksna vidēja auguma suņiem**  
**Kiltix kaklasiksna liela auguma suņiem**

## 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena kaklasiksna satur:

### **Aktīvās vielas:**

Kiltix kakla siksna maza auguma suņiem:

Propoksūrs 1,25 g  
Flumetrīns 0,281 g

Kiltix kakla siksna vidēja auguma suņiem:

Propoksūrs 3,02 g  
Flumetrīns 0,68 g

Kiltix kakla siksna liela auguma suņiem:

Propoksūrs 4,5 g  
Flumetrīns 1,013 g

## 4. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem ērcu (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) un blusu (*Ctenocephalides canis/felis*) invāzijas apkarošanai un reinvāzijas novēršanai.

Pēc uzlikšanas kaklasiksnas darbība pret blusām un ērcēm ilgst līdz 6 mēnešiem maza auguma suņiem.

Pēc uzlikšanas kaklasiksnas darbība pret blusām un ērcēm ilgst līdz 7 mēnešiem vidēja auguma suņiem.

Pēc uzlikšanas kaklasiksnas darbība pret blusām un ērcēm ilgst līdz 7 mēnešiem liela auguma suņiem.

## 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar mehānisku gremošanas vai urīnizvadsistēmas orgānu nosprostojumu, bronhiālo astmu vai citām elpošanas vai sirds-asinsvadu slimībām.

Nelietot kucēniem līdz 3 mēnešu vecumam.

Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēti plaši ādas bojājumi.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti var novērot tādas uzvedības pazīmes kā uzbudinājums vai letargija. Ļoti retos gadījumos var parādīties tādas aplikācijas vietas reakcijas kā nieze, apsārtums, bojājumi vai apmatojuma zudums.

Ļoti retos gadījumos dažiem dzīvniekiem var rasties neliela nieze vai ādas apsārtums pēc kaklasiksnas uzvilšanas. Ļoti reti pēc iekšķīgas kaklasiksnas uzņemšanas var parādīties tādi simptomi kā vemšana, caureja vai siekalošanās.

Ja vajadzīgs, rīkojas saskaņā ar sadaļu "Īpaši brīdinājumi". Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ārīgai lietošanai.

Lietošana: aplikēt vienu kaklasiksnu ap suņa kaklu.

Maza auguma suņiem (<10 kg) lieto Kiltix kaklasiksnu maza auguma suņiem (12,5 g smaga un aptuveni 38 cm gara).

Vidēja auguma suņiem (10-25 kg) lieto Kiltix kaklasiksnu vidēja auguma suņiem (30,2 g smaga un aptuveni 53 cm gara).

Liela auguma suņiem (>25 kg) lieto Kiltix kaklasiksnu liela auguma suņiem (45,0 g smaga un aptuveni 70 cm gara).

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izņemiet kaklasiksnu no iepakojuma, atritiniet un noņemiet plastmasas sloksnītes siksnas iekšpusē. Aplieciet kaklasiksnu sunim brīvi ap kaklu, izvelkot siksnas otru galu caur nostiprinājumiem. Regulāri pārbaudiet kaklasiksnas stāvokli. Kaklasiksna jānēsā nepārtraukti. Atsevišķos gadījumos sunim Kiltix lietošanas laikā var novērot ērcu invāziju. Ērces var pieķerties dzīvniekam, bet iet bojā vēlākais trīs dienu laikā parasti nepiesūcoties ar asinīm.

Kiltix efektivitāte un iedarbības ilgums ir atkarīgs no dzīvnieka apmatojuma garuma, blīvuma un stāvokļa, kā arī invāzijas pakāpes. Optimālai aizsardzībai pirms kaklasiksnas uzlikšanas, dzīvniekus ar savēlušos, netīru, taukainu apmatojumu mazgā ar šampūnu.

Pirms dzīvnieka mazgāšanas vai peldināšanas kaklasiksnu noņem un atkārtoti uzliek pēc apmatojuma izžūšanas. Vairākkārtēja spēcīga siksnas samitrināšana (lietus, peldēšanās, mazgāšana) samazina kaklasiksnas iedarbības efektivitāti.

Blusas bieži invadē arī dzīvnieka guļvietu un apkārtējo vidi (paklājus un aizkarus), tāpēc būtu jālieto piemērots pretktoparazītu līdzeklis telpām un jāveic regulāra tīrīšana ar putekļsūcēju. Šie pasākumi palīdz samazināt blusu populāciju apkārtējā vidē un pasargā suni no jaunas invāzijas.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzeramā ūdens un dzīvnieku barības.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu. Izvairīties no saskares ar acīm vai degunu.

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanās iespēju pēc kaklasiksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvietas un vietas, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklāji un mīkstās mēbeles, regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un jātīra ar putekļsūcēju.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietošanas laikā izvairīties no pārmērīgas saskares ar kaklasiksnu un pēc uzlikšanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru vai flumetrīnu, vai kādu no palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Maziem bērniem un zīdaiņiem nepieļaut saskari ar suni, kurš nēsā Kiltix kaklasiksnu.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā kaklasiksnu.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Neļaut bērniem spēlēt ar kakla siksnu un to košļāt.

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.

Neēst, nedzert un nesmēķēt kakla siksnas lietošanas laikā.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Karbamītu saindēšanās simptomi, piemēram, siekalošanās, zīlīšu paplašināšanās, vemšana vai caureja, var parādīties, īpaši, ja kaklasiksna tikusi košļāta vai norīta. Ja karbamītu saindēšanās klīniskās pazīmes parādās, ārstēšanu veic ar simptomātiskiem līdzekļiem un antidota atropīna intravenozu ievadīšanu.

Šajā gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību pie ārsta vai veterinārārsta.

Grūsnība un laktācija:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Abas aktīvās vielas nav klasificētas kā embriotoksiskas, teratogēnas vai ar toksisku ietekmi uz reprodukciju, tā kā grūsnām vai laktējošām kucēm nav gaidāmi šādi efekti.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem vai akaricīdiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas simptomi nav gaidāmi. Pētījumos, lietojot divas Kiltix kaklasiksna vienlaicīgi dažāda vecuma, svara un šķirnes suņiem, neradīja nekādas ar ārstēšanu saistītas lokālas vai sistēmiskas (asins bioķīmijas, hematoloģiskas, holīnesterāzes, urīna, uzvedības izmaiņas) nepanesamības pazīmes. Ja parādās simptomi, kas norāda uz saindēšanos ar karbamātiem, veic simptomātisko terapiju un intravenozi ievada antidotu – atropīnu.

Citi pasākumi

Aktīvā viela propoksūrs ir ļoti toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs zāles var izraisīt ilgstošu nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.

Dzīvnieki, kuriem uzlikta kaklasiksna, nedrīkst iekļūt ūdenstilpēs. Nelietot iepakojumu atkārtoti.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus.

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

01/2024

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.