

MARKĒJUMS
V/MRP/21/0072

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA
IEPAKOJUMA MARKĒJUMS**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Topimec F 10 mg/ml / 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
Ivermectinum
Clorsulonum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Satur 10 mg/ml ivermektīna un 100 mg/ml klorsulona.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
250 ml
500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai injekcijai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem (gaļai un blakusproduktiem): 66 dienas.
Pienam: nelietot govīm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
Nelietot nelaktējošām slaucamām govīm, tostarp grūsnām telēm, 60 dienu laikā pēc dzemdībām.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc pirmās devas izvilksšanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējās caurduršanas izlietot līdz ____/____.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

ĻOTI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENĪ DZĪVOJOŠIEM ORGANISMIEM.

Zāles vai izlietotie injektori nedrīkst nonākt ūdenstilpēs vai grāvjos.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/21/0072

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
APDRUKĀTA KARTONA KASTĪTE**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Topimec F 10 mg/ml / 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem

Ivermectinum

Clorsulonum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Satur 10 mg/ml ivermektīna un 100 mg/ml klorsulona.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

250 ml

500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai injekcijai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 66 dienas.

Pienam: nelietot govīm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Nelietot nelaktējošām slaucamām govīm, tostarp grūsnām telēm, 60 dienu laikā pēc dzemdībām.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nelietot intramuskulāri vai intravenozi.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc pirmās devas izvilšanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējās caurduršanas izlietot līdz ____/____.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

ĻOTI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENĪ DZĪVOJOŠIEM ORGANISMIEM.

Zāles vai izlietotie iepakojumi nedrīkst nonākt ūdenstilpēs vai grāvjos.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/21/0072

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot