

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG  
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**KARTON  
SPRAYDOSE**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Animedazon Spray, 2,45 % w/w Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Spraydose enthält:

**Wirkstoff:**

Chlortetracyclinhydrochlorid: 3,210 g (entsprechend 2,45 % w/w)  
(entsprechend 2,983 g Chlortetracyclin)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

211 ml

12 x 211 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf, Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut.

Sprühen Sie 3 Sekunden lang in einem Abstand von etwa 15 - 20 cm, bis die zu behandelnde Fläche gleichmäßig gefärbt ist.

**Klaueninfektionen:** Nach 30 Sekunden wiederholen.

**Moderhinke/Panaritium:** 2x im Abstand von 30 Sekunden 1x oder 2x täglich aufsprühen. In Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung und des Heilungsverlaufs innerhalb von 1 bis 3 Tagen wiederholen.

**Oberflächliche Wunden:** Einmalige Anwendung bei Kontamination mit Chlortetracyclinempfindlichen Erregern.

**Dermatitis digitalis:** 2x im Abstand von 30 Sekunden 1x oder 2x am Tag an drei aufeinander folgenden Tagen aufsprühen.

Die Spraydose vor Gebrauch gründlich schütteln.

Dieses Tierarzneimittel kann schwere Augenreizungen verursachen. Augen und Gesicht schützen. Undurchlässige Handschuhe tragen.

Einatmen des Sprays vermeiden. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und den Behälter vorzeigen.

#### **7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe, Milch: 0 Tage

Nicht anwenden am Euter laktierender Tiere, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

#### **8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

#### **9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.  
Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.  
Von Hitze/heißen Oberflächen/Funken/offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen.  
Nicht gegen eine offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

#### **10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### **11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

#### **12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.  
Gefahr



Zeichen für „Extrem entzündbar“.

#### **13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

aniMedica GmbH

DE:  
Mitvertreiber:  
aniMedica GmbH

Vertrieb AT:  
OGRIS Pharma Vertriebsgesellschaft m.b.H.  
Hinderhoferstraße 3  
A-4600 Wels

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

AT: Zul.-Nr.: 8-00762  
DE: Zul.-Nr.: 401011.00.00

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}