

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBA – VAC

Živá lyofilizovaná vakcína proti infekční burzitidě

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, živý oslabený kmen 1/65/PV: 10^3 EID₅₀ - 10^4 EID₅₀ *

*50% infekční dávka pro embrya

Pomocné látky:

Laktóza, 0,9% roztok NaCl v čištěné vodě

4. INDIKACE

Profylaktická imunizace orální cestou (v pitné vodě), proti infekční burzitidě u kuřat.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Žádné.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí - kuřata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálně v pitné vodě.

K získání správné vakcinační suspenze je třeba přidat malé množství vody k obsahu lahvičky a důkladně roztřepat, pak nalít suspenzi do pitné vody potřebné pro vakcinaci a vypláchnout lahvičku tak, aby byla jistota, že žádný zbytek lyofilizované vakcíny nepříjde do odpadu.

Po disperzi obsahu lahvičky v pitné vodě je třeba zajistit opětné důkladné promíchání bezprostředně před aplikací, která by pak měla být dokončena v co nejkratší době.

Množství vody, nezbytné pro zajištění jednotné vakcinace je 10 – 20 ml na každé kuře s přihlédnutím ke stáří, období a teplotě prostředí.

V následující tabulce je uvedeno doporučené minimální a maximální množství vody pro kuřata různého stáří:

*Stáří kuřat
(Týdny)*

*Množství vody (litry)
1000 dávek*

0 - 2

7 – 10

3 - 5

10 - 20

6 - 12

20 - 60

více než 12

50 - 80

Vakcinační schéma:

IBA – VAC může být podán jak brojlerům, tak těžkým a lehkým nosným plemenům; jedno ošetření je zcela dostačující k vyvolání trvalé imunity. Doporučuje se provést vakcinaci ve věku 12 – 15 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby po vakcinaci bylo dosaženo nejlepšího výsledku, měla by být věnována pozornost následujícím doporučením:

- zajistit, aby napáječky a pitná voda neobsahovaly žádné antiseptické nebo dezinfekční látky, protože i jejich stopy mohou inaktivovat vakcinační virus;
- kde je to možné, používat plastické, skleněné nebo smaltované napáječky;
- zajistit, aby zvířata byla žíznivá, tím, že jim je odebrána voda alespoň tři hodiny před aplikací vakcíny;
- suspenze vakcíny, získané rozpuštěním přípravku, musí být distribuována do dostatečného počtu napáječek, který umožní vakcinaci všech zvířat během dvou až tří hodin;
- nevystavovat vakcinační suspenzi tepelným zdrojům.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Po rozpuštění lyofilizátu musí být vakcína použita během dvou hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku.

Všechny nepoužité veterinární přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2009

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení:

10×1000 dávek (1000 dávek/lahvička)

10×2500 dávek (2500 dávek/lahvička)

