

NAVODILO ZA UPORABO

1. Ime zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Livacox T peroralna suspenzija za piščance

2. Sestava

Vsak odmerek cepiva vsebuje:

Učinkovine:

<i>Eimeria tenella</i>	300 do 500 oocist atenuiranega seva
<i>Eimeria acervulina</i>	300 do 500 oocist atenuiranega seva
<i>Eimeria maxima</i>	300 do 500 oocist atenuiranega seva

suspendiranih v 1 % vodni raztopini kloramina B

Peroralna suspenzija je belkaste do sivo-bele barve.

3. Ciljne živalske vrste

Piščanci.

4. Indikacije

Preprečevanje kokcidioze, ki jo povzročajo *Eimeria acervulina*, *E. maxima* in *E. tenella*.
Izmed 7 kokcijev, ki parazitirajo pri domači perutnini, so te 3 vrste ekonomsko pomembne pri pitanju brojlerjev.

Nastop imunosti: 10 do 14 dni po cepljenju.

Trajanje imunosti: doživljenjska imunost za vrste kokcijev, ki jih cepivo vsebuje.

5. Kontraindikacije

Jih ni.

6. Posebna opozorila

Posebna opozorila:

Cepite samo zdrave piščance v dobrih higienskih pogojih.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah:

Živali morajo biti dovolj žejne, da bodo vodo s cepivom popile v dveh urah.

Pred uporabo je treba plastenko s cepivom dobro pretresti in suspendirati v takšni količini vode za pitje, kolikor jo bodo žejne živali lahko popile v dveh urah po odmerjanju cepiva.

Zagotovite zadostno število napajalnih mest, da vsi piščanci popijejo potreben odmerek cepiva.

V času celotne vzreje ne uporabljamo kokcidiostatikov v hrani in vodi za pitje.

Kadar pošiljamo v diagnostične preiskave (patološko - anatomske ali parazitološke) vzorce ali trupla poginulih piščancev, moramo v anamnestičnih podatkih navesti, da so bile živali cepljene proti kokcidiozi s cepivom Livacox T.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri rokovanju z zdravilom je priporočljivo uporabljati osebno zaščitno opremo - rokavice, saj cepivo vsebuje kloramin B, ki lahko pri občutljivih ljudeh draži kožo ali dihalne poti.

Ptice v obdobju nesnosti:

Ne uporabite pri pticah v obdobju nesnosti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Ne uporabite antikokcidijskih sredstev 2 dni pred cepljenjem s cepivom in 14 dni po njem, v tem obdobju tudi ne zdravite s sulfonamidi.

Preveliko odmerjanje:

Ni neželenih učinkov tudi pri desetkratnem prevelikem odmerku.

Glavne inkompatibilnosti:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini.

7. Neželeni dogodki

Piščanci:

Nedoločena pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)	Začasno poslabšanje konverzije krme*
--	--------------------------------------

* Mogoče opaziti pri piščancih 1-2 tedna po cepljenju.

Poročanje o neželenih dogodkih je pomembno, saj omogoča stalno spremljanje varnosti zdravila. Če opazite kakršne koli neželene učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, ali mislite, da zdravilo ni delovalo, se najprej obrnite na svojega veterinarja. O vseh neželenih dogodkih lahko poročate tudi imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, pri čemer uporabite kontaktne podatke na koncu tega navodila za uporabo, ali preko nacionalnega sistema za poročanje:

<https://www.jazmp.si/spletni-obrazec/>

8. Odmerki za posamezno živalsko vrsto, poti in način uporabe zdravila

Peroralna uporaba (dajanje v vodo za pitje)

Piščance cepimo v starosti od 1 do 10 dni.

Odmerjanje

Količino cepiva in vode, v kateri je le to suspendirano, je treba prilagoditi številu in starosti piščancev. Za optimalno odmerjanje potrebne količine vode za pitje uporabljamo naslednjo formulo:

Število (tisoč) x starost piščancev (dni) = količina vode v litrih.

Npr. za cepljenje 1000 piščancev, starih 5 dni, je treba 10 ml cepiva (1 ml cepiva = 100 odmerkov) resuspendirati v 5 l vode za pitje ($1 \times 5 = 5$), oz. za cepljenje 5000 piščancev, starih 7 dni, je treba resuspendirati 50 ml cepiva v 35 l vode za pitje ($5 \times 7 = 35$).

9. Nasvet o pravilni uporabi zdravila

Pred uporabo je treba plastenko s cepivom dobro pretresti in suspendirati v ustrezni količini čiste vode. Da bi piščanci postali žejni, jim vodo odvzamemo 3 ure pred cepljenjem.

Napajalnega prostora mora biti dovolj, da bodo vsi piščanci lahko pili, vodo s cepivom pa popili v dveh urah.

Cepivo lahko dajemo preko ročnih in avtomatskih napajalnih sistemov, vključno s kapljičnimi napajalniki (nipple).

10. Karenca

Nič dni.

11. Posebna navodila za shranjevanje

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Ne zamrzujte.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini po Exp.

Rok uporabnosti po resuspendiranju v skladu z navodili: uporabite takoj.

12. Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke.

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo pri uporabi tega zdravila, je treba odstraniti po sistemu vračanja zdravil v skladu z lokalnimi zahtevami oziroma morebitnimi nacionalnimi sistemi zbiranja, ki se uporabljajo za zadevno zdravilo.

Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

13. Razvrstitev zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Na veterinarski recept.

14. Številka dovoljenja za promet in velikosti pakiranja

NP/V/0535/001

Kartonska škatla z 10 plastenkami po 10 ml (10 x 1000 odmerkov) cepiva.

Kartonska škatla z 10 plastenkami po 50 ml (10 x 5000 odmerkov) cepiva.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

15. Datum zadnje revizije besedila navodila za uporabo

7.7.2025

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo v zbirki podatkov Unije o zdravilih (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktni podatki

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ter kontaktni podatki za sporočanje domnevnih neželenih učinkov:

GENERA SI d.o.o.
Parmova ulica 53
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 (0)1 436 4466

Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d.d.
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica
10436 Rakov potok, Hrvaška

in

Biopharm – Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs,
CZ-254 49 Jilove,
Češka

17. Druge informacije

Živo atenuirano cepivo spodbuja tvorbo specifičnih protiteles proti kokcidiozi.