

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
CatShield 1,918 g medikovaný obojek pro kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CatShield 1,918 g medikovaný obojek pro kočky
Stirofosum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 bílý medikovaný obojek obsahuje:

Léčivá látka:

Stirofosum 1,918 g

4. INDIKACE

Působí proti blechám (*Ctenocephalides felis*) u koček.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat: u nemocných nebo oslabených koček,
u zvířat se sníženou funkcí jater,
nepoužívat u koťat do 6 měsíců,
u zvířat s přecitlivělostí na organofosfátové sloučeniny.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas se může vyskytnout dráždění na krku v důsledku nošení obojku. Pokud k tomu dojde, doporučuje se odstranění obojku až do úplného vymizení symptomů. Žádná zvláštní léčba není nutná.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování: 1 obojek pro jednu kočku

Doba účinnosti: působení obojku je optimální po 4 dnech a trvá 8 měsíců proti blechám (*Ctenocephalides felis*).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob aplikace: Obojek zapněte kolem krku kočky, aby nebyl příliš těsný, odstříhněte přebývající část obojku s přihlédnutím na možný růst zvířete.

Obojek, který přiléhá příliš těsně ke krku zvířete, může způsobit podráždění kůže.

Obojek je vodě odolný, voda v důsledku deště, plavání nebo mytí nemá vliv na účinek obojku.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Obojek, který přiléhá příliš těsně ke krku zvířete, může způsobit podráždění kůže.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Obojek je vodě odolný, plavání, mytí nemá vliv na uvolňování látky z obojku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou precitlivělostí na stirofos (tetrachlorvinphos) by se měli vyhnout přímému kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

Březost a laktace

Použití u březích nebo laktujících koček se nedoporučuje.

Interakce

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

U koček dochází k intoxikaci většinou v důsledku kousání obojku.

První pomoc: odstraňte obojek

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Beaphar Eastern Europe s.r.o.

Revoluční 1381/III

290 01 Poděbrady

+420 325 611 650