

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met één injectieflacon van 100 ml
Doos met één fles van 250 ml
Doos met 10 dozen met daarin elk 1 injectieflacon van 100 ml
Doos met 30 dozen met daarin elk 1 injectieflacon van 100 ml
Doos met 12 dozen met daarin elk 1 fles van 250 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Peniyet vet 300 mg/ml suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:
Procaïne benzylpenicilline monohydraat 300 mg
(overeenkomend met 170,40 mg benzylpenicilline)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml
10x100 ml
30x100 ml
12x250 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund, schaap en varken

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Varkens:

Vlees en slachtafval: 6 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Runderen:

Vlees en slachtafval: 6 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Melk: 96 uren (4 dagen)

Schapen:

Vlees en slachtafval: 4 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
6 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen
Melk: 156 uur (6,5 dagen)

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken voor:

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.

Bewaar de injectieflacon/fles in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Laboratorios Syva, S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V541520

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket injectieflacon 100 ml
Etiket voor fles van 250 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Peniyet vet 300 mg/ml suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Procaïne benzylpenicilline monohydraat.....300 mg
(overeenkomend met 170,40 mg benzylpenicilline)

3. DOELDIERSOORTEN

Rund, schaap en varken

4. TOEDIENINGSWEGEN

Intramusculair gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Varkens:

Vlees en slachtafval: 6 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Runderen:

Vlees en slachtafval: 6 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen
Melk: 96 uren (4 dagen)

Schapen:

Vlees en slachtafval: 4 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen
6 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen
Melk: 156 uur (6,5 dagen)

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken voor:

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.

Bewaar de injectieflacon/fles in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Laboratorios Syva S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}