

CÍMKE / HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fernicol 100 mg/ml oldat ivóvízben történő alkalmazásra házityúkok és sertések részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Fortevit Kft., H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

A gyártási tételek felszabadításért felelős gyártó:

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg, Északi Iparterület, Kamilla u. 3.

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Fernicol 100 mg/ml oldat ivóvízben történő alkalmazásra házityúkok és sertések részére A.U.V.
Florfenikol

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml tartalmaz:

Hatóanyag: Florfenikol 100 mg

Segédanyag: Makrogol 400

4. JAVALLAT(OK)

Házityúk: Florfenikolra érzékeny *E. coli* okozta fertőzések kezelésére.

Sertés: Pleuropneumónia (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), atrófiás rinitisz (*Pasteurella multocida*), Glässer-betegség (*Haemophilus parasuis*) kezelésére.

Az állomány kezelésének megkezdése előtt a kórokozót izolálni kell és antibiotikum érzékenységét meg kell határozni.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Házityúk esetében nincs ismert mellékhatás.

Sertésben az állatok vízfogyasztásának kismértékű csökkenése, sötétbarna bélsár, és bélsárrekedés figyelhető meg a kezelés során.

A végbélnyílás környékének kivörösödése és lágy bélsár esetenként előfordulhat a gyógyszer alkalmazása után. Ezek az elváltozások múló jellegűek, rövid ideig tartanak, és nem befolyásolják az állatok általános állapotát.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkeznek)
- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkeznek)
- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkeznek)
- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkeznek)
- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkeznek, beleértve az izolált eseteket is).

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Házityúk, sertés.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Ivóvízbe keverendő.

Házityúk: A florfenikol napi adagja 4 hetes korig 20 mg/kg – ez 100 ml Fernicol 100 mg/ml belsőleges oldatnak felel meg 100 liter ivóvízre számítva. Négyhetesenél idősebb korban 200 ml Fernicol 100 mg/ml belsőleges oldatot kell 100 liter ivóvízhez adni. A kezelés időtartama 5 nap.

Sertés: A florfenikol napi adagja 10 mg testtömeg-kilogrammonként, vagyis egy 100 kg tömegű sertés napi adagja 10 ml Fernicol 100 mg/ml belsőleges oldat. A kezelés időtartama 5 nap.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Ivóvízbe keverendő.

A kezelés ideje alatt az állatok csak gyógyszerrel kezelt ivóvizet fogyaszthatják. Ha az ól levegőjének magasabb hőmérséklete miatt nagy az állatok vízfogyasztása, az ivóvíz gyógyszer-koncentrációját a naponta elfogyasztott vízmennyiség és a testtömegre számított dózis függvényében kell beállítani.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Házityúk:

Hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 23 nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Fagyástól óvni kell.

Az eredeti csomagolásban tárolandó a fénytől és a nedvességtől való megóvás érdekében.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 nap.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óra.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Ha az istálló levegőjének magasabb hőmérséklete miatt nagyobb a vízfogyasztás, akkor a gyógyszer koncentrációját az ivóvízben a napi vízfogyasztásnak és a testtömeg-kilogrammmra számított adagnak megfelelően módosítani kell.

Ha a gyógyszert ivóvízbe keverve alkalmazzák és a florfenikol végső koncentrációja meghaladja az 1 grammot ivóvíz-literenként, akkor a hatóanyag kicsapódhat.

Az állatgyógyászati készítményt az antibiotikum-érzékenység vizsgálata alapján kell alkalmazni. Az állatgyógyászati készítmény szakszerűtlen használata növelheti a florfenikolra rezisztens baktériumok prevalenciáját.

A kezelés időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A véletlenül a bőrre ömlött oldatot vízzel le kell öblíteni.

Florfenikol és polietilén-glikolok iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést.

Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőkesztyű.

Vemhesség, laktáció, vagy tojásrakás idején történő alkalmazás

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején.

Fertilitás:

Nem alkalmazható tenyészkánoknál.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók

Nem állnak adatok rendelkezésre.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok) ha szükséges

Túladagolás esetén a súlygyarapodás és a vízfogyasztás csökkenése, végbélkörnyéki bőrpír és vizenyő, továbbá egyes hematológiai és biokémiai paraméterek kiszáradásra utaló módosulása figyelhető meg.

Főbb inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. október 13.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1 liter, garanciazáras kupakkal lezárt műanyag flakonban.

5 liter, garanciazáras kupakkal lezárt műanyag kannában.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Törzskönyvi szám:

3565/1/14 NÉBIH ÁTI (1 liter)

3565/2/14 NÉBIH ÁTI (5 liter)

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

Gyártási szám:

Felhasználható: