

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/03/1571

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

KARBASEPTAS ziede ārīgai lietošanai liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g ziedes satur:

Aktīvās vielas:

Metilsalicilāts 20 mg,

Kampars 20 mg.

Palīgvielas:

Karbamīds (urīnviela) 50 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Ziede ārīgai lietošanai.

Balta ziede.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Liellopi, zirgi, suņi, kaķi.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Ādas, mīksto audu, cīpslu un locītavu iekaisumu, sastiepumu, sasitumu, tesmeņa pietūkuma, nekrotizējošu, strutojošu brūču ārstēšanai liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem. Papildu līdzeklis mastīta ārstēšanai.

4.3 Kontrindikācijas

Nav.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav piemērojami.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Nav piemērojami.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaikus ar citām ziedēm.

4.9 Devas un lietošanas veids

Ārīgai lietošanai.

Ieziest ar ziedi bojātos ādas rajonus (notīrītas brūces, pietūkumi, sasitumi, tesmeņa pietūkums un tml.). Ziedi lietot 2-3 reizes dienā tik ilgi, kamēr samazinās pietūkums, iztīrās netīrumi no brūcēm un izveidojas granulācijas audi.

Ieziestu pietūkušu tesmeni ieteicams viegli pamasēt. Slaucamo govju ārstēšanai ziedi ieteicams lietot 6 stundas pirms slaukšanas vai uzreiz pēc slaukšanas.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Liellopi, zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 0 dienas.

Pienam: 0 dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ādu mīkstinājošie un aizsargājošie līdzekļi.

ATĶ vet kods: QD02AX.

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Kampars, kairinādams ādu, izraisa tās hiperēmiju, paātrina vielmaiņu un uzlabo vielmaiņas produktu uzsūkšanos, samazina nervu galu jutīgumu. Kampars, sajaukts ar minerālvielām, neuzsūcas, atvēsinā ādu, vēlāk silda un noņem ādas virsmas nervu galu sāpes.

Metilsalicilāts gandrīz neiedarbojas uz ķermeņa temperatūru, taču, ja dzīvnieka ķermeņa temperatūra ir paaugstināta, tas noņem karstumu. Pie ādas iekaisumiem metilsalicilāts arī noņem karstumu. Iekaisuma perēklī eksudāts kļūst skābāks, metilsalicilāts ātri sadalās, veidojas brīva salicilskābe, kurai piemīt pretiekaisuma iedarbība tikai iekaisuma perēklī. Lietojot ziedi, bojāta āda tiek atvēsināta, noņemtas sāpes, dzīvnieks kļūst mierīgāks, novērš uzmanību no brūces vai nemaz nepieskaras brūcei. Ziede samazina audu uztūkumu apkārt brūcei un slāpē iekaisuma reakciju. Ziede uz brūci iedarbojas, sadalīdama nekrotiskos audus, atdalīdama bojātos audus no veselajiem, un tīra brūci, kamēr tiek likvidēti nekrotiskie audi un strutas. Ziede iztīrītā brūcē stimulē granulāciju. Granulācijas audi ir rozā krāsā, tiem samazinoties, izveidojas plāni rētaudi.

5.2 Farmakokinētiskie dati

Metilsalicilāts, lietots ārīgi, viegli absorbējas, to veicina arī tādi faktori kā siltums, kustība, pārsējs un iekļūšana ādā. Ātrā lokālā salicilskābes hidrolīze pēc ārīgas lietošanas audos izraisa zemu sistēmisku

metilsalicilāta koncentrāciju plazmā. Sistēmiski salicilskābe labi saistās ar olbaltumvielām neaktīvā formā un brīvā aktīvā formā metabolizējas, vai neizmainītā veidā izdalās ar urīnu. Ļoti maz ir zināms par āriņi lietota kampara farmakokinētiskajām īpašībām.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Karbamīds
Trietanolamīns
Vazelīns, dzeltenais
Stearīnskābe
Glicerīna monostearāts
Attīrīts ūdens

6.2 Būtiska nesaderība

Nav zināma.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Nesasaldēt. Sargāt no tiešiem saules stariem.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Polipropilēna trauciņi pa 100 g, 250 g, polipropilēna spainīši pa 1 kg un plastmasas (HDPE/PP) spainīši pa 10 kg un 18 kg.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB „Ruvera“
Žemaitės g. 145
LT-76139 Šauļi
Lietuva

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/03/1571

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 01/08/2003
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 18/08/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2021

**RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS**

Nav piemērojams.