

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/05/1231

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

V/NRP/05/ 1667

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

V/NRP/05/1668

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m

06516 Carros

Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

Permetrīns 400 mg

Piriproksifēns 3 mg

Palīgviela(s):

Butilhidroksianizols, butilhidroksitoluols, dietilēnglikola monoetilēteris.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu iznīcināšanai.

Jaunas pieaugušu blusu invāzijas profilaksei līdz 4 nedēļām.

Blusu vairošanās ierobežošanai līdz 8 nedēļām, inhibējot nenobriedušu blusu attīstību līdz pieaugušu blusu stadijai.

Pret ērcēm:

Invāzijas profilaksei 4 nedēļu garumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kaķiem.

Nelietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Tā kā nav pieejamu datu, Duowin contact nedrīkst lietot kucēniem līdz 2 mēnešu vecumam, kā arī suņiem, kuru ķermeņa svars ir mazāks par 2 kg.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažiem dzīvniekiem pēc Duowin contact šķīduma aplikācijas iespējama pastiprināta siekalošanās, vemšana un nieze. Šīs blakusparādības galvenokārt ir viegli izteiktas un pārejošas.

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Lietošanai uz ādas.

Rekomendētā minimālā deva ir 106 mg perimetrīna un 0,8 mg piriproksifēna / kg ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu šādu devu, lietojiet:

- maziem suņiem < 7,5 kg: vienu 2 ml pipeti;
- vidēja auguma suņiem 7,5–15 kg: vienu 4 ml pipeti;
- lieliem suņiem 15–30 kg: vienu 8 ml pipeti;
- ļoti lieliem suņiem >30 kg: divas 8 ml pipetes.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Turiet pipeti vertikāli. Izņemiet vāciņu. Apgriežiet ar augšdaļu uz leju un, sākot no pamatnes, spiediet tūbiņu, turot pipeti saskarsmē ar ādu.

Duowin contact šķīdumu aplicēt tieši uz ādas pa dzīvnieka muguras līniju — no astes pamatnes līdz kakla daļas skaustam.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tikai ārīgai lietošanai.

Pēc Duowin cuntact aplikācijas 48 stundas izvairīties no dzīvnieka saskarsmes ar ūdeni (mazgāšana vai peldes).

Lai pēc Duowincontact aplikācijas samazinātu iespējamās blakusparādības (vemšana, siekalošanās), jānovērš dzīvnieka pārmērīga laizīšanās.

Izvairīties no produkta saskarsmes ar ādu un acīm. Pēc šķīduma aplikācijas mazgāt rokas, īpaši ja tas nokļuvis uz lietotāja ādas. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem un dzērieniem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

04/2011

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OŪ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Igaunija
Tālr.: + 3726709006