

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-100, 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline (като hydrochloride) – 100 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml
250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение и контрол на широк кръг от общи системни, респираторни, гастроинтестинални, уринарни и локални инфекции, причинени от или свързани с чувствителни към окситетрациклина микроорганизми (като *Bordetella*, *Campylobacter*, *Chlamydia*, *E. coli*, *Haemophilus*, *Mycoplasma*, *Pasteurella*, *Rickettsia*, *Salmonella*, *Staphylococcus* и *Streptococcus* spp.) при говеда, овце, кози и свине.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

Средна доза за всички видове животни, за които е предназначен продуктът:

5 – 10 мг/кг (2.5 – 5.0 мл на 50 кг телесна маса) дневно за 3 - 5 дни.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни.

Мляко: 96 часа (от 9-то издождане при крави, които се доят два пъти дневно).

Свине, кози и овце:

Месо и вътрешни органи: 15 дни.

Не се разрешава за употреба при лактиращи овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След първо отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8° С.

Да не се замразява.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”
--

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-2564

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 50 ml, 100 ml и 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-100, 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline (като hydrochloride) – 100 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни.

Мляко: 96 часа (от 9-то издождане при крави, които се доят два пъти дневно).

Свине, кози и овце:

Месо и вътрешни органи: 15 дни.

Не се разрешава за употреба при лактиращи овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °C.

Да не се замразява

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП