

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Puppy 100 mg/ml  
Suspensie voor oraal gebruik  
Suspension buvable  
Suspension zum Einnehmen

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Fenbendazol(e) 100 mg/ml

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 ml

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond.  
Chien.  
Hund.

**5. INDICATIES**

Voor de behandeling van volwassen honden en pups geïnfecteerd met immature en volwassen vormen van gastro-intestinale rondwormen en eveneens voor de behandeling van lintwormen (*Taenia* spp.) bij honden. Honden en pups: *Toxocara canis* (volwassen en immature stadia), *Toxascaris leonina* (volwassen stadia), *Ancylostoma caninum* (volwassen en immature stadia), *Uncinaria stenocephala* (volwassen en immature stadia), *Trichuris vulpis* (volwassen stadia), *Taenia pisiformis* (volwassen stadia).

Eveneens voor de behandeling van honden geïnfecteerd met longworm (*Oslerus osleri*).

Pour le traitement des chiens adultes et chiots infestés par les formes matures et immatures des nématodes gastro-intestinaux et également pour le traitement des chiens infestés par des cestodes *Taenia* spp.

Chiens et chiots : *Toxocara canis* (formes matures et immatures), *Toxascaris leonina* (formes matures), *Ancylostoma caninum* (formes matures et immatures), *Uncinaria stenocephala* (formes matures et immatures), *Trichuris vulpis* (formes matures), *Taenia pisiformis* (formes matures).  
Également pour le traitement des chiens infestés par le ver du poumon (*Oslerus osleri*).

Zur Behandlung von erwachsenen Hunden und Welpen, die mit unreifen und erwachsenen Formen von Magen-Darm-Spulwürmern infiziert sind, sowie zur Behandlung von Bandwürmern (*Taenia* spp.) bei Hunden.

Hunden und Welpen: *Toxocara canis* (reifen und unreifen Stadien), *Toxascaris leonina* (reifen Stadien), *Ancylostoma caninum* (reifen und unreifen Stadien), *Uncinaria stenocephala* (reifen und unreifen Stadien), *Trichuris vulpis* (reifen Stadien), *Taenia pisiformis* (reifen Stadien).  
Auch zur Behandlung von mit Lungenwürmern infizierten Hunden (*Oslerus osleri*).

## 6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.  
Voie orale.  
Zum Einnehmen.

### Gebruik:

- Bij voorkeur mengen met het voer.
- Direct in de muil na het voederen bij niet-gespeende dieren.

### Utilisation :

- À mélanger de préférence à la nourriture.
- Directement dans la gueule après la prise de nourriture chez les animaux non sevrés.

### Anwendung:

- Am besten mit dem Futter vermischen.
- Unmittelbar im Maul nach der Fütterung bei nicht entwöhnten Tieren.

| Lichaamsgewicht<br>Poids corporel<br>Körpergewicht | Dag/Jour/Tag 1 | Dag/Jour/Tag 2 | Dag/Jour/Tag 3 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-1 kg                                             | 0,5 ml         | 0,5 ml         | 0,5 ml         |
| 1-2 kg                                             | 1 ml           | 1 ml           | 1 ml           |
| 2-4 kg                                             | 2 ml           | 2 ml           | 2 ml           |
| 4-6 kg                                             | 3 ml           | 3 ml           | 3 ml           |
| 6-8 kg                                             | 4 ml           | 4 ml           | 4 ml           |
| 8-10 kg                                            | 5 ml           | 5 ml           | 5 ml           |

## 7. WACHTTIJD(EN)

-

## 8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

## 9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C. Beschermen tegen bevriezing.  
À conserver en dessous de 25 °C. Ne pas congeler.  
Unter 25°C lagern. Nicht einfrieren.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
À usage vétérinaire uniquement.  
Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V205703

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket flacon 100 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Puppy 100 mg/ml  
Suspensie voor oraal gebruik  
Suspension buvable  
Suspension zum Einnehmen

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Fenbendazol(e) 100 mg/ml

**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond.  
Chien.  
Hund.

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.  
Voie orale.  
Zum Einnehmen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WACHTTIJD(EN)**

-

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren beneden 25° C. Beschermen tegen bevriezing.  
À conserver en dessous de 25 °C. Ne pas congeler.  
Unter 25°C lagern. Nicht einfrieren.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

Intervet International B.V.

|                        |
|------------------------|
| <b>9. PARTIJNUMMER</b> |
|------------------------|

Lot {nummer}