ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Purevax RCPCh liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

In una dose da 1 ml o da 0,5 ml:

Sostanze attive:
Herpesvirus attenuato della rinotracheite felina (ceppo FHV F2) ..... . $\geq 10^{4,9}$ $DICC_{50}$[1]
Antigeni del calicivirus felino inattivato (ceppi FCV 431 e G1) ..... ≥ 2,0 U. ELISA
Chlamydophila felis attenuata (ceppo 905) ..... $\geq 10^{3,0}$ DIU_{50}[2]
Virus attenuato della panleucopenia felina (PLI IV) ..... $\geq 10^{3,5}$ $DICC_{50}$[1]

[1] dose infettante il 50% delle colture cellulari
[2] dose infettante il 50% delle uova

Eccipienti:

Composizione qualitativa degli eccipienti e di altri costituenti	**Composizione quantitativa se essenziale per la corretta somministrazione del medicinale veterinario**
Liofilizzato:	
Saccarosio	
Sorbitolo	
Destrano 40	
Idrolisato di caseina	
Idrolisato di collagene	
Dipotassio fosfato	
Potassio fosfato monobasico	
Idrossido di potassio	
Cloruro di sodio	
Disodio idrogeno ortofosfato	
Fosfato monopotassico anidro	
Acqua per preparazioni iniettabili	
Solvente:	
Acqua per preparazioni iniettabili	*q.b. a 1 ml o a 0,5 ml*

Liofilizzato: pellet beige omogeneo.
Solvente: liquido limpido incolore.

3. INFORMAZIONI CLINICHE

3.1 Specie di destinazione

Gatti.

3.2 Indicazioni per l'uso per ciascuna specie di destinazione

Immunizzazione attiva dei gatti di 8 settimane, o più, di età:
- nei confronti della rinotracheite virale felina, per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della infezione da calicivirus felino, per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della infezione da C*hlamydophila felis,* per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della panleucopenia felina, per la prevenzione della mortalità e dei sintomi clinici.

L'inizio dell'immunità per le componenti rinotracheite, calicivirosi, *Chlamydophila felis* e panleucopenia è stato dimostrato essere pari a 1 settimana dopo la vaccinazione di base.

Durata dell'immunità:
- per le componenti rinotracheite, calicivirosi e panleucopenia: 1 anno dopo la vaccinazione di base e 3 anni dopo l'ultimo richiamo vaccinale.
- per la componente *Chlamydophila felis*: 1 anno dopo l'ultimo richiamo vaccinale.

3.3 Controindicazioni

Nessuna.

3.4 Avvertenze speciali

Vaccinare solo animali sani.

3.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:
Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:
In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.
Si raccomanda alle persone immunocompromesse o in terapia con farmaci immunosoppressivi di evitare il contatto con il vaccino. In caso di auto-iniezione, avvertire immediatamente il medico e informarlo che si è verificata l'auto-iniezione con un vaccino contenente la Clamidia viva.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:
Non pertinente.

3.6 Eventi avversi

Gatti:

Comuni (da 1 a 10 animali su 100 animali trattati)	Stato transitorio di apatia, anoressia e ipertermia[1] (osservate nel corso di studi di campo e di sicurezza). Reazioni al sito di inoculo (lieve dolore alla palpazione, prurito o edema circoscritto)[2] (osservate nel corso di studi di campo e di sicurezza)
Non comuni (da 1 a 10 animali su 1.000 animali trattati)	Reazione da ipersensibilità[3] (osservata in studi di campo)
Molto rari (< 1 animale / 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)	Vomito[4], ipertermia e letargia transitorie, a volta associate a zoppia[5] (sulla base di esperienze post-marketing)

[1] generalmente di durata pari a 1 o 2 giorni
[2] che scompaiono al massimo nell'arco di 1 o 2 settimane
[3] può richiedere un trattamento sintomatico adeguato
[4] principalmente entro 24-48 ore
[5] osservate da 1 a 3 settimane dopo la vaccinazione di richiamo in gatti adulti

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un medicinale veterinario. Le segnalazioni devono essere inviate, preferibilmente, tramite un veterinario, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al suo rappresentante locale o all'autorità nazionale competente mediante il sistema nazionale di segnalazione. Vedere anche l'ultimo paragrafo del foglietto illustrativo per i rispettivi recapiti.

3.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non usare durante tutta la gravidanza e l'allattamento.

3.8 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere miscelato e somministrato con il vaccino non adiuvato Boehringer Ingelheim contro la leucemia felina e/o somministrato lo stesso giorno ma non miscelato con il vaccino adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.
Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere miscelato e somministrato con il vaccino non adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari, tranne i prodotti summenzionati. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

3.9 Vie di somministrazione e posologia

Via sottocutanea.

Ricostituire delicatamente il vaccino fino ad ottenere una sospensione uniforme con moderata presenza di schiuma.
Aspetto visivo dopo la ricostituzione: sospensione limpida leggermente gialla.

Dopo la ricostituzione del liofilizzato con 0,5 ml o 1 ml di solvente (a seconda della confezione scelta), iniettare una dose di vaccino secondo lo schema vaccinale seguente:

Vaccinazione di base:
- prima iniezione: a partire da 8 settimane di età,
- seconda iniezione: da 3 a 4 settimane dopo la prima vaccinazione.

Qualora ci si aspetti la presenza di alti livelli di anticorpi di origine materna nei confronti delle componenti rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia o *Chlamydophila* (ad esempio nei gattini da 9 a 12 settimane di età, nati da madri vaccinate prima della gravidanza e/o con precedente esposizione all'(agli) agente(i) patogeno(i) nota o sospetta), la vaccinazione di base deve essere posticipata fino a 12 settimane di età.

Richiami:
- il primo richiamo deve essere effettuato un anno dopo la vaccinazione di base per tutte le componenti,
- i richiami successivi devono essere effettuati:
  - per la componente clamidiosi: ogni anno.
  - per le componenti rinotracheite, calicivirosi e panleucopenia: ad intervalli fino a tre anni.

3.10 Sintomi di sovradosaggio (e, se pertinente, procedure d'emergenza e antidoti)

Non sono stati osservati effetti diversi da quelli già quelli menzionati al paragrafo 3.6 "Eventi avversi", ad eccezione di uno stato di ipertermia che può eccezionalmente durare 5 giorni.

3.11 Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego, comprese le restrizioni sull'uso degli antimicrobici e dei medicinali veterinari antiparassitari allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza

La somministrazione deve essere eseguita esclusivamente dal medico veterinario.

3.12 Tempi di attesa

Non pertinente.

4. INFORMAZIONI IMMUNOLOGICHE

4.1 Codice ATCvet: QI06AJ03 (virus della rinotracheite felina + antigeni del calicivirus felino inattivato + virus vivo della panleucopenia felina / parvovirus + clamidia viva).

Vaccino contro la rinotracheite virale felina, la calicivirosi felina, la clamidiosi e la panleucopenia felina.
Il vaccino induce una immunità attiva contro l'herpesvirus della rinotracheite felina, il calicivirus felino, *Chlamydophila felis* e il virus della panleucopenia felina.
Il prodotto si è dimostrato in grado di ridurre l'escrezione di calicivirus felino al momento dell'insorgenza dell'immunità e fino ad 1 anno dalla vaccinazione.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

5.1 Incompatibilità principali

Non miscelare con il vaccino adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.

5.2 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.
Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

5.3 Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare e trasportare in frigorifero (2 °C – 8 °C).
Proteggere dalla luce.
Non congelare.

5.4 Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone in vetro tipo I contenente 1 dose di liofilizzato e flacone in vetro tipo I contenente 1 ml o 0,5 ml di solvente, entrambi chiusi con un tappo in elastomero di butile e sigillati con una ghiera di alluminio o plastica.

Scatola in plastica contenente 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato e 10 flaconi da 1 ml di solvente.
Scatola in plastica contenente 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato e 50 flaconi da 1 ml di solvente.
Scatola in plastica contenente 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato e 10 flaconi da 0,5 ml di solvente.
Scatola in plastica contenente 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato e 50 flaconi da 0,5 ml di solvente.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

5.5 Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.

6. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

7. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/2/04/050/001-004

8. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 23/02/2005

9. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GG/MM/AAAA

10. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali dell'Unione.

ALLEGATO II

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nessuna.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Scatola in plastica contenente 10 flaconi di liofilizzato e 10 flaconi di solvente
Scatola in plastica contenente 50 flaconi di liofilizzato e 50 flaconi di solvente

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Purevax RCPCh liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile

2. INDICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE

In una dose da 1 ml o da 0,5 ml:
FHV (ceppo F2) ..... $\geq 10^{4,9}$ $DICC_{50}$
FCV (ceppi 431 e G1) ..... ≥ 2,0 U. ELISA
Chlamydophila felis (ceppo 905) ..... $\geq 10^{3,0}$ DIU_{50}
FPV (PLI IV)..... $\geq 10^{3,5}$ $DICC_{50}$

3. CONFEZIONI

Liofilizzato (10 x 1 dose) + solvente (10 x 1 ml)
Liofilizzato (50 x 1 dose) + solvente (50 x 1 ml)
Liofilizzato (10 x 1 dose) + solvente (10 x 0,5 ml)
Liofilizzato (50 x 1 dose) + solvente (50 x 0,5 ml)

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

5. INDICAZIONI

6. VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso sottocutaneo.

7. TEMPI DI ATTESA

8. DATA DI SCADENZA

Exp. (gg/mm/aaaa)
Dopo la ricostituzione usare immediatamente.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare e trasportare in frigorifero.
Proteggere dalla luce.

Non congelare.

10. LA SCRITTA "PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO"

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

11. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

12. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

13. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/2/04/050/001 Liofilizzato (10 x 1 dose) + solvente (10 x 1 ml)
EU/2/04/050/002 Liofilizzato (50 x 1 dose) + solvente (50 x 1 ml)
EU/2/04/050/003 Liofilizzato (10 x 1 dose) + solvente (10 x 0,5 ml)
EU/2/04/050/004 Liofilizzato (50 x 1 dose) + solvente (50 x 0,5 ml)

15. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

Flacone di liofilizzato

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Purevax RCPCh

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DELLE SOSTANZE ATTIVE

1 dose

3. NUMERO DI LOTTO

Lot

4. DATA DI SCADENZA

Exp. (gg/mm/aaaa)

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

Flacone di solvente

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Purevax RCPCh solvente

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DELLE SOSTANZE ATTIVE

1 ml o 0,5 ml

3. NUMERO DI LOTTO

Lot

4. DATA DI SCADENZA

Exp. (gg/mm/aaaa)

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

1. Denominazione del medicinale veterinario

Purevax RCPCh liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

2. Composizione

In una dose da 1 ml o da 0,5 ml:

Sostanze attive:
Herpesvirus attenuato della rinotracheite felina (ceppo FHV F2) ..... $\geq 10^{4,9}$ $DICC_{50}$[1]
Antigeni del calicivirus felino inattivato (ceppi FCV 431 e G1) ..... ≥ 2,0 U.ELISA
Chlamydophila felis attenuata (ceppo 905) ..... $\geq 10^{3,0}$ DIU_{50}[2]
Virus attenuato della panleucopenia felina (PLI IV) ..... $\geq 10^{3,5}$ $DICC_{50}$[1]

[1] dose infettante il 50% delle colture cellulari
[2] dose infettante il 50% delle uova

Solvente:
Acqua per preparazioni iniettabili ..... q.b. a 1 ml o a 0,5 ml.

Liofilizzato: pellet beige omogeneo.
Solvente: liquido limpido incolore.

3. Specie di destinazione

Gatti

4. Indicazioni per l'uso

Immunizzazione attiva dei gatti di 8 settimane, o più, di età:
- nei confronti della rinotracheite virale felina, per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della infezione da calicivirus felino, per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della infezione da C*hlamydophila felis,* per la riduzione dei sintomi clinici,
- nei confronti della panleucopenia felina, per la prevenzione della mortalità e dei sintomi clinici.

L'inizio dell'immunità, per le componenti rinotracheite, calicivirosi, *Chlamydophila felis* e panleucopenia, è stato dimostrato essere pari a 1 settimana dopo la vaccinazione di base.

Durata dell'immunità:
- per le componenti rinotracheite, calicivirosi e panleucopenia: 1 anno dopo la vaccinazione di base e 3 anni dopo l'ultimo richiamo vaccinale.
- per la componente *Chlamydophila felis*: 1 anno dopo l'ultimo richiamo vaccinale.

5. Controindicazioni

Nessuna.

6. Avvertenze speciali

Vaccinare solo animali sani.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:
In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.
Si raccomanda alle persone immunocompromesse o in terapia con farmaci immunosoppressivi di evitare il contatto con il vaccino. In caso di auto-iniezione, avvertire immediatamente il medico e informarlo che si è verificata l'auto-iniezione con un vaccino contenente la Clamidia viva.

Gravidanza e allattamento:
Non usare durante tutta la gravidanza e l'allattamento.

Interazioni con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:
Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere miscelato e somministrato con il vaccino non adiuvato Boehringer Ingelheim contro la leucemia felina e/o somministrato lo stesso giorno ma non miscelato con il vaccino adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.
Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere miscelato e somministrato con il vaccino non adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari, tranne i prodotti summenzionati. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

Sovradosaggio:
Non sono stati osservati effetti diversi da quelli già menzionati al paragrafo "Eventi avversi", ad eccezione di uno stato di ipertermia che può eccezionalmente durare 5 giorni.

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:
La somministrazione deve essere eseguita esclusivamente dal medico veterinario.

Incompatibilità principali:
Non miscelare con il vaccino adiuvato Boehringer Ingelheim contro la rabbia.

7. Eventi avversi

Gatti:

Comuni (da 1 a 10 animali su 100 animali trattati)
Stato transitorio di apatia, anoressia e ipertermia[1] (osservate nel corso di studi di campo e di sicurezza). Reazioni al sito di inoculo (lieve dolore alla palpazione, prurito o edema circoscritto)[2] (osservate nel corso di studi di campo e di sicurezza)
Non comuni (da 1 a 10 animali su 1.000 animali trattati)
Reazione da ipersensibilità[3] (osservata in studi di campo)
Molto rari (< 1 animale / 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)
Vomito[4], ipertermia e letargia transitorie, a volta associate a zoppia[5] (sulla base di esperienze post-marketing)

[1] generalmente di durata pari a 1 o 2 giorni
[2] che scompaiono al massimo nell'arco di 1 o 2 settimane
[3] può richiedere un trattamento sintomatico adeguato
[4] principalmente entro 24-48 ore
[5] osservate da 1 a 3 settimane dopo la vaccinazione di richiamo in gatti adulti

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione.

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Via sottocutanea.

Dopo la ricostituzione del liofilizzato con 0,5 ml o 1 ml di solvente (a seconda della confezione scelta), iniettare una dose di vaccino secondo lo schema vaccinale seguente:

Vaccinazione di base:
- prima iniezione: a partire da 8 settimane di età,
- seconda iniezione: da 3 a 4 settimane dopo la prima vaccinazione.

Qualora ci si aspetti la presenza di alti livelli di anticorpi di origine materna nei confronti delle componenti rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia o *Chlamydophila* (ad esempio nei gattini da 9 a 12 settimane di età, nati da madri vaccinate prima della gravidanza e/o con precedente esposizione all'(agli) agente(i) patogeno(i) nota o sospetta), la vaccinazione di base deve essere posticipata fino a 12 settimane di età.

Richiami:
- il primo richiamo deve essere effettuato un anno dopo la vaccinazione di base per tutte le componenti,
- i richiami successivi devono essere effettuati:
  - per la componente clamidiosi: ogni anno.
  - per le componenti rinotracheite, calicivirosi e panleucopenia: ad intervalli fino a tre anni.

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Ricostituire delicatamente il vaccino fino ad ottenere una sospensione uniforme con moderata presenza di schiuma.
Aspetto visivo dopo la ricostituzione: sospensione limpida leggermente gialla.

10. Tempi di attesa

Non pertinente.

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare e trasportare in frigorifero (2 °C – 8 °C).
Proteggere dalla luce.
Non congelare.
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sul flacone dopo Exp.
Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

EU/2/04/050/001-004

Scatola in plastica contenente:
10 x 1 dose di liofilizzato e 10 x 1 ml di solvente oppure
50 x 1 dose di liofilizzato e 50 x 1 ml di solvente oppure
10 x 1 dose di liofilizzato e 10 x 0,5 ml di solvente oppure
50 x 1 dose di liofilizzato e 50 x 0,5 ml di solvente.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

MM/AAAA

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali dell'Unione.

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Germania

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
Francia

Rappresentanti locali e recapiti per la segnalazione di sospette reazioni avverse

België/Belgique/Belgien
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Република България
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel: +359 2 958 79 98

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Tel: +370 5 2595942

Luxembourg/Luxemburg
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Česká republika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111

Danmark
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Tlf: + 45 3915 8888
Deutschland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Tel: 0800 290 0 270
Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filiaal
Tel: +372 612 8000

Ελλάδα
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Τηλ: +30 2108906300
España
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.
Tel: +34 93 404 51 00
France
Boehringer Ingelheim Animal Health France, SCS
Tél: +33 4 72 72 30 00

Hrvatska
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel: +385 1 2444 600

Ireland
Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited
Tel: +353 1 291 3985

Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000
Italia
Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Tel: +39 02 53551
Κύπρος
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Τηλ: +30 2108906300
Latvija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Tel: +371 67 240 011

Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG
Magyarországi Fióktelep
Tel: +36 1 299 8900
Malta
Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited
Tel: +44 1344 746957
Nederland
Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv
Tel: +31 20 799 6950
Norge
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Tlf: +47 66 85 05 70

Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel: +43 1 80105-6880
Polska
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 699 0 699
Portugal
Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda.
Tel: +351 21 313 5300

România
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Viena - Sucursala Bucureşti
Tel: +40 21 302 28 00

Slovenija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Tel: +421 2 5810 1211
Suomi/Finland
Vetcare Oy
Puh/Tel: + 358 201443360
Sverige
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Tlf: +46 (0)40-23 34 00
United Kingdom (Northern Ireland)
Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited
Tel: + 44 1344 746957

17. Altre informazioni

Il prodotto si è dimostrato in grado di ridurre l'escrezione di calicivirus felino al momento dell'insorgenza dell'immunità e fino ad un anno dalla vaccinazione.