

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/95/0155

Dewo 100mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem, kaķiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

BREMER PHARMA GMBH
Werkstrasse 42
34414 Warburg
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dewo 100mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem, kaķiem
Levamisolum

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Aktīvā viela:

1 ml šķīduma satur -
Levamisola hidrohlorīds 117,9 mg,
(ekvivalents levamizolam 100.0 mg).

Palīgvielas:

Nātrijs metabisulfīts, metil-parahidroksibenzoāts, propil-parahidroksibenzoāts, dinātrijs edetāta dihidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrijs hidroksīds, ūdens injekcijām.

4. INDIKĀCIJAS

Antihelmintisks līdzeklis pret gastrointestinālajām un plaušu nematodēm liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem. Darbības spektrs pret šādām parazītu sugām:

Liellopi, aitas, kazas: pieaugušie parazīti *Dictyocaulus viviparus*, *Haemonchus* spp. (*H. contortus*, *H. placei*), *Ostertagia* spp. (*O. ostertagi*, *O. circumcincta*), *Trichostrongylus* spp., (*T. axei*, *T. colubriformis*, *T. vitrinus*), *Cooperia* spp. (*C. oncophora*, *C. punctata*, *C. pectinata*), *Nematodirus* spp. (*N. helvetianus*, *N. fillicollis*, *N. battus*, *N. spatiger*), *Bunostomum* spp. (*B. phlebotomum*, *B. trigonocephalum*), *Oesophagostomum* spp. (*O. radiatum*, *O. venulosum*, *O. columbianum*), *Chabertia ovina*, *Toxocara vitulorum*, kā arī *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Cooperia* spp., *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Oesophagostomum*, un *Chabertia* kāpuru stadijas.

Cūkas: pieaugušie parazīti *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp. (*O. dentatum*, *O. quadrispinulatum*); pieaugušie parazīti un kāpuri *Metastrongylus* spp. (*M. apri*).

Suņi, kaķi: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma* spp. (*A. caninum*, *A. tubaeforme*), *Uncinaria stenocephala*.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuri slimo ar nieru slimībām, grūsniem dzīvniekiem, kā arī nopietnu vispārējā veselības stāvokļa traucējumu gadījumā. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu cilvēku uzturam.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vienas stundas laikā pēc injekcijas iespējami parasimpatomimētiski klīniskie simptomi, tādi kā nemiers, patvaļīgas muskuļu kontrakcijas un siekalošanās. Simptomi izzūd pēc 2-3 stundām bez speciālas ārstēšanas.

Reizēm tika konstatēts lokāls audu iekaisums injekcijas vietā, kurš izzūd dažu nedēļu laikā.

Cūkām, kas invadētas ar *Metastongylus spp.*, neilgu laiku pēc zāļu lietošanas būt klepus un rīstīšanās. Šos pārejošos simptomus izraisa plaušu kāpuru izvadīšana un tie liecina par lietoto zāļu prettārpu iedarbību.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, kazas, cūkas, suņi, kaķi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Injekcijām zemādā vai intramuskulāri:

Vispārējā deva: 0.05 ml/kg ķermeņa svara
(atbilst 5 mg levamizola/kg ķermeņa svara)

Liellopiem: 5 ml / 100 kg ķermeņa svara
Aitām, kazām: 1 ml / 20 kg ķermeņa svara
Cūkām: 2,5 ml / 50 kg ķermeņa svara
Suņiem, kaķiem: 0,25 ml / 5 kg ķermeņa svara

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 10 ml šķīduma.

Liellopiem intramuskulārā injekcija ieteicama elkoņa muskuļa apvidū, injekcija zemādā jāveic pakaklē.

Vienreizēja deva ir pietiekoša dzīvnieku attārpošanai. Ganību periodā ārstēšanu var atkārtot pēc 4-6 nedēļām, ņemot vērā invāzijas klātbūtni. Ieteicams veikt ganāmpulku attārpošanu pirms un pēc ganību perioda.

Nelietot dzīvniekiem, kuru pienu izmanto cilvēku uzturam.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā 15 - 25°C.

Sargāt no gaismas.

Nelietot pēc marķējumā norādītā derīguma termiņa beigām.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nikotīns un zāles ar nikotīnerģisku iedarbību (pirantels, morantels) paaugstina levamizola nikotīnerģisko aktivitāti un toksicitāti. Levamizolu nevajadzētu lietot kopā ar neomicīnu, sulfonamīdiem, tetraciklīnu un fenilbutazonu.

Toksiska darbība izpaužas dubultojojot ieteicamo devu; dzīvnieki nobeidzas, ja ieteicamā deva tiek pārsniegta 6-8 reizes.

Saindēšanās cēlonis ar levamizolu ir tā nikotīnerģiskā iedarbība, līdzīgi kā saindējoties ar fosfororganiskajiem savienojumiem. Toksiskās darbības klīniskie simptomi - siekalošanās, nemiers, tremors, palēnināta sirdsdarbība, sašaurinātas acu zīlītes, dažos gadījumos caureja, elpas trūkums un kolaps.

Ar levamizolu akūtas saindēšanās gadījumā ieteicams intravenozi ievadīt atropīna sulfātu devā 3 mg/kg ķermeņa svara parasimpatikomimētiskās darbības atcelšanai.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām..

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2012

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

50 ml, 10 x 50 ml

100 ml, 12 x 100 ml

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.