

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Alamycin LA 300

300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed ovini

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo

Ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 300 mg

Eccipienti

Sodio formaldeide solfossilato 4 mg

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 **Specie di destinazione**

Bovini, suini, ovini

4.2 **Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione**

Alamycin LA 300 è un antibiotico ad ampio spettro indicato per il trattamento di infezioni primarie o secondarie nei bovini, suini e ovini, provocate da un'ampia gamma di batteri Gram+ e Gram- sensibili all'ossitetraciclina, in particolare:

Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Erysipelotrix rhusiopathiae, Pasteurella spp, Staphylococcus spp e Streptococcus spp nonché anche alcuni *Mycoplasma, Rickettsiae, Protozoi e Chlamydia*.

Alamycin LA 300 è indicata per il trattamento di infezioni sistemiche, respiratorie, urinarie locali causate da microrganismi ossitetraciclina sensibili come: pasteurellosi, polmoniti, rinite atrofica, malrossino, anaplasmosi, affezioni articolari e **terapia di supporto della mastite, aborto enzootico e cheratocongiuntivite nella pecora.**

4.3 **Controindicazioni**

Non usare in caso di ipersensibilità alle tetracicline.

4.4 **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Se in parallelo si effettua un'altra terapia, usare un differente punto di inoculo.

4.5 **Precauzioni speciali per l'impiego**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non diluire Alamycin LA 300.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con accertata ipersensibilità alle tetracicline non devono avere alcun contatto con il prodotto.

In caso di autoiniezione accidentale il parere di un medico dovrebbe essere cercato immediatamente

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Alamycin LA 300 è normalmente ben tollerato, tuttavia occasionalmente si può verificare una leggera reazione locale, di natura passeggera.

Reazioni di ipersensibilità, inclusa anafilassi (talvolta fatale), sono state riportate raramente.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

L'uso delle tetracicline durante l'ultima fase della gravidanza, che comprende il periodo di formazione dei denti e delle ossa, può provocare delle macchie sugli stessi e deformazione e fragilità ossea. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Somministrando **Alamycin LA 300** alla dose standard di 20 mg/kg p.v. si ottiene un'attività di 3 - 4 giorni mentre, alla dose elevata di 30 mg/kg p.v. si ottiene un'attività più prolungata, che persiste per 5 - 6 giorni.

Bovini, suini e ovini:

Dose standard: 20 mg/kg p.v. (1 ml/15 kg p.v.)

Dose elevata: 30 mg/kg p.v. (1 ml/10 kg p.v.)

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedura di emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti dati di sovradosaggio.

4.11 Tempi di attesa

Per le carni:

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

Bovini, ovini: 28 giorni

Suini: 14 giorni

Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)

Bovini: 35 giorni

Suini, ovini: 28 giorni

Per il latte Bovino: entrambe le dosi: 7 giorni

Per il latte Ovino: entrambe le dosi: 8 giorni

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici per uso sistemico.

ATC vet code: QJ01AA06.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Alamycin LA 300 è una soluzione iniettabile acquosa sterile, per uso intramuscolare, contenente 300 mg/ml di ossitetraciclina base sotto forma di ossitetraciclina diidrato. Farmacodinamica dovrebbe essere completato.

5.2 Informazioni farmacocinetiche.

Alamycin LA 300 è stata formulata specificamente per ottenere un'attività antibatterica prolungata. Con una sola iniezione intramuscolare di 20 mg/kg p.v. si ottiene un livello ematico efficace per 3 - 4 giorni mentre, alla dose di 30 mg/kg p.v., l'attività antibatterica persiste per 5 - 6 giorni.

La massima concentrazione ematica si raggiunge entro 4 - 6 ore dalla somministrazione, pertanto **Alamycin LA 300** può essere usata efficacemente anche per il trattamento delle infezioni acute.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Magnesio ossido
Dimetilacetamide
Sodio formaldeide sulfossilato
Monoetanolamina
Acqua p.p.i.

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità. non miscelare con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.
Periodo di validità dopo la prima apertura del flacone: 28 giorni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura inferiori a 25 °C, proteggere dalla luce.
Tenere fuori della portata dei bambini.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Alamycin LA 300 è confezionato in:
flacone in vetro giallo di Tipo I da 100 ml e da 250 ml. Tappo in gomma bromobutilico e ghiera in allumino.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate-Monaghan
Ireland

Rappresentante per la vendita in Italia

Vetoquinol Italia Srl.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102807017

Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102807029

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE**

16/01/2003- 16/01/2008

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

09/2022

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

MODALITA' DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

**INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO - SCATOLA DI
CARTONE**

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ALAMYCIN LA 300

ossitetraciclina 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini.

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g

Eccipienti: sodio formaldeide solfossilato.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile

4. CONFEZIONI

100 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, suini, ovini.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPI DI ATTESA

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

bovini, ovini: 28 giorni

suini: 14 giorni

Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)

bovini: 35 giorni

suini, ovini: 28 giorni

Per il latte bovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

Per il latte ovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD:

Dopo l'apertura, usare entro 28 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dalla luce.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate-

Monaghan -Ireland

Rappresentante per la vendita in Italia:

Vetoquinol Italia Srl.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

16. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102807017

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n°

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO - SCATOLA DI CARTONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ALAMYCIN LA 300

ossitetraciclina 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini.

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g

Eccipienti: sodio formaldeide solfossilato.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile

4. CONFEZIONI

250 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, suini, ovini.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPI DI ATTESA

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

bovini, ovini: 28 giorni

suini: 14 giorni

Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)

bovini: 35 giorni

suini, ovini: 28 giorni

Per il latte bovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

Per il latte ovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD:

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dalla luce.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate-Monaghan

Ireland

Rappresentante per la vendita in Italia:

Vetoquinol Italia Srl.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

16. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102807029

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n°

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO - ETICHETTA DEL FLACONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ALAMYCIN LA 300

ossitetraciclina 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini.

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g

Eccipienti: sodio formaldeide solfossilato.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile

4. CONFEZIONI

Flacone da 100 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, suini, ovini.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPI DI ATTESA

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

bovini, ovini: 28 giorni

suini: 14 giorni

Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)

bovini: 35 giorni

suini, ovini: 28 giorni

Per il latte bovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

Per il latte ovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD:

Dopo l'apertura usare entro 28 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dalla luce.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate-Monaghan

Ireland

Rappresentante per la vendita in Italia:

Vétoquinol Italia Srl.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

16. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102807017

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n°

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO - ETICHETTA DEL FLACONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ALAMYCIN LA 300

ossitetraciclina 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini.

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g

Eccipienti: sodio formaldeide solfossilato.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile

4. CONFEZIONI

Flacone da 250 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, suini, ovini.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPI DI ATTESA

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

bovini, ovini: 28 giorni

suini: 14 giorni

Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)

bovini: 35 giorni

suini, ovini: 28 giorni

Per il latte bovino:

entrambe le dosi: 7 giorni

Per il latte ovino:

entrambe le dosi: 8 giorni

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD:

Dopo l'apertura usare entro 28 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dalla luce.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO

SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norbrosk Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate-Monaghan
Ireland

Rappresentante per la vendita in Italia:

Vétoquinol Italia Srl.
Via Piana 265
47032 Bertinoro (FC)

16. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102807029

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n°

FOGLIO ILLUSTRATIVO

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate-Monaghan
Ireland

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Norbrook Manufacturing Ltd
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlanda

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Camlough Road
Newry
Co. Down, BT35 6JP - (Irlanda del Nord)

Rappresentante per la vendita in Italia:

Vétoquinol Italia Srl,
Via Piana 265 - 47032 Bertinoro (FC)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO ALAMYCIN LA 300 ossitetraciclina soluzione iniettabile 300 mg/ml per bovini, suini ed ovini

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g.
Eccipienti: sodio formaldeide solfossilato.

4. INDICAZIONI

Alamycin LA 300 è un antibiotico ad ampio spettro indicato per il trattamento di infezioni primarie o secondarie, provocate da un'ampia gamma di batteri Gram+ e Gram- sensibili all'ossitetraciclina.

In particolare:

Bordetella bronchiseptica, *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp e *Streptococcus* spp. nonché *Mycoplasma*, *Rickettsiae*, *Protozoi* e *Chlamydia*.

Alamycin LA 300 è indicata per il trattamento di infezioni sistemiche, respiratorie, urinarie locali causate da microrganismi ossitetraciclina sensibili come: pasteurellosi, polmoniti, rinite atrofica, malrossino, anaplasmosi, affezioni articolari e **terapia di supporto della mastite, aborto enzootico e cheratocongiuntivite nella pecora.**

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità alle tetracicine.

6. REAZIONI AVVERSE

Alamycin LA 300 è normalmente ben tollerato, tuttavia occasionalmente si può verificare una leggera reazione locale, di natura passeggera.

Reazioni di ipersensibilità, inclusa anafilassi (talvolta fatale), sono state riportate raramente. L'uso delle tetracicine può determinare fenomeni allergici o anafilattici (che recedono con l'uso di adrenalina, cortisonici, ecc.), dismicrobismo intestinale (con dolori colici, grave diarrea, che in alcuni soggetti può risultare anche mortale), intolleranza locale (con fenomeni irritativi ed istolesivi) ed alterazione della funzionalità epatica (con steatosi ed alterazione delle prove di funzionalità). Le tetracicine si depositano nel tessuto osseo e nei denti in via di formazione, con possibilità di dare deformazione e fragilità ossea. Le tetracicine possono causare fotosensibilità.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, suini, ovini.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: intramuscolare profonda.

Somministrando **Alamycin LA 300** alla dose standard di 20 mg/kg p.v. si ottiene un'attività di 3 - 4 giorni mentre, alla dose elevata di 30 mg/kg p.v. si ottiene un'attività più prolungata, che persiste per 5 - 6 giorni.

Bovini, suini, ovini:

Dose standard 20 mg/kg p.v. (1 ml/15 kg p.v.)

Dose elevata 30 mg/kg p.v. (1 ml/10 kg p.v.)

Per assicurare il corretto dosaggio determinare quanto più accuratamente possibile il peso dell'animale per evitare il sotto o sovradosaggio.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Leggere attentamente le avvertenze prima della somministrazione del prodotto.

Per assicurare il corretto dosaggio determinare quanto più accuratamente possibile il peso dell'animale per evitare il sotto o sovradosaggio.

10. TEMPI DI ATTESA

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 kg p.v.)

bovini, ovini: 28 giorni
suini: 14 giorni
Dose elevata (1 ml/10 kg p.v.)
bovini: 35 giorni
suini, ovini: 28 giorni
Per il latte bovino:
entrambe le dosi: 8 giorni
Per il latte ovino:
entrambe le dosi: 8 giorni.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura inferiore a 25 °C, proteggere dalla luce.
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Se in parallelo si effettua un'altra terapia, usare un differente punto di inoculo.

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non diluire Alamycin LA 300.

Se possibile, l'ossitetraciclina deve essere usata esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma.

Un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti all'ossitetraciclina.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con accertata ipersensibilità alle tetracicline non devono avere alcun contatto con il prodotto. In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

L'uso delle tetracicline durante l'ultima fase della gravidanza, che comprende il periodo di formazione dei denti e delle ossa, può provocare delle macchie sugli stessi e deformazione e fragilità ossea. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti dati di sovradosaggio.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità. non miscelare con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

09/ 2022

15. ALTRE INFORMAZIONI

Quando un flacone è aperto e il contenuto esposto all'aria, la soluzione può imbrunire senza però perdere di efficacia.

Confezioni

Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102807017

Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102807029

PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.