

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 4/24/40/80 JERINGAS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ORBENIN 600 mg suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 3,6 g contiene:

Cloxacilina (benzatina)..... 600 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 jeringas
24 jeringas
40 jeringas
80 jeringas.

4. ESPECIES DE DESTINO


Bovino (vacas en secado).

5. INDICACIONES DE USO


6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administrar una jeringa de ORBENIN en cada cuarterón inmediatamente después del último ordeño de la lactación, antes de iniciar el periodo de secado.

Orbenin posee un adaptador que le posibilita utilizar cánula corta o larga. La utilización de la cánula corta evita la total penetración de la misma en el canal del pezón.




Convencional



Corto

Largo de cánula opcional

Como seleccionar y usar la cánula corta



Como seleccionar

Sujete la parte superior del capuchón entre sus dedos índice y pulgar.
Dóblela, rómpala y retire el capuchón como indica el diagrama.


La cánula no debe tocarse con los dedos.

Como utilizar

Inserte sólo el segmento superior de la cánula dentro del canal del pezón como indica el diagrama.

Presione el émbolo de la jeringa de forma suave y continuada hasta introducir toda la suspensión dentro del canal del pezón y de la cisterna de la ubre.

Como seleccionar y usar la cánula larga



Como seleccionar

Sujete la base del capuchón entre sus dedos índice y pulgar.

Para retirar el capuchón entero, dóblelo y tire del mismo como indica el diagrama.

La cánula no debe tocarse con los dedos.

Como utilizar

Inserte la cánula dentro del canal del pezón de la manera habitual.

Presione sobre el émbolo de la jeringa de forma suave y continuada hasta introducir toda la suspensión dentro del canal del pezón y de la cisterna de la ubre.

Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 28 días.

Leche: 4 días tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 42 días.

46 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 42 días o inferior.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

No refrigerar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2517 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
ETIQUETA DE LA JERINGA**

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ORBENIN

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cloxacilina (benzatina)..... 600 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.