

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

{Boîte pour flacon de 20 ml, 50 ml, 100 ml ou 250 ml}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rheumoxidyl 20 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient : 20 mg de méloxicam

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcins et chevaux

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION****Bovins :**

Injection unique sous-cutanée ou intraveineuse.

Porcins :

Injection intramusculaire unique. Si nécessaire, une deuxième administration peut être administrée après 24 heures.

Chevaux :

Injection intraveineuse unique.

Lisez la notice avant utilisation.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Bovins : viande et abats: 15 jours ; lait: 120 heures.

Porcins : viande et abats : 5 jours.

Chevaux : viande et abats : 5 jours.

Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

EXP {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

C&H Generics Limited

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V661413

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

{Étiquette pour flacons de 50 ml, 100 ml et 250 ml}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rheumoxidyl 20 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient : 20 mg de méloxicam

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcins et chevaux

4. VOIES D'ADMINISTRATION**Bovins :**

S.C. simple ou I.V. injection.

Porcins :

Injection intramusculaire unique. Si nécessaire, une deuxième administration peut être administrée après 24 heures.

Chevaux :

IV unique injection.

Lisez la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Bovins : viande et abats: 15 jours ; lait: 120 heures.

Porcins : viande et abats : 5 jours.

Chevaux : viande et abats : 5 jours.

Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

EXP {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

C&H Generics Limited

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

{Etiquette pour flacons 20 ml}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rheumoxidyl 20 mg/ml solution injectable pour bovins, porcins et chevaux

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient : 20 mg de méloxicam

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

EXP {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...