

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Kenocidin Spray and Dip

Hlorheksidīna diglukonāts, 5 mg/ml, šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens pupu apstrādei slaucamām govīm

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā ml sastāvā:

Aktīvā viela:

Hlorheksidīna diglukonāts	5,00 mg
(Līdzvērtīgs hlorheksidīnam	2,815 mg)

Palīgvielas:

Briljantzila 85% (E133)	0,035 mg
Glicerīns	60.00 mg
Alantoīns	1.00 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens pupu apstrādei
Zils viskozs šķidrums

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Slaucamām govīm

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pupu dezinfekcijai, kas ietilpst mastīta profilakses plānā laktējošām slaucamām govīm.
Pupu ādas un pupu galu kopšanai.

4.3 Kontrindikācijas

Nelietojiet, ja ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu vai citām palīgvielām

4.4 Īpaši brīdinājumi <par katru mērķa sugu>

Nodrošināt pupu un tesmens tīrību un sausumu pirms nākamās slaukšanas.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram, ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskie anjoni, tāpēc nejausajaukt ar krāna ūdeni, citām ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citiem produktiem, kas paredzēti pupu un tesmeņa kopšanai.

Šis veterinārais medicīnas produkts paredzēts tesmeņa kopšanai, un ievērojama uzsūkšanās nenotiek.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ja parādās slimības pazīmes, konsultēties ar veterinārārstu.

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms pakļaujat govīs mitriem (lietainiem), aukstiem vai vējainiem apstākļiem, ļaujiet produktam nožūt.

Ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms liellopu laišanas ārā pupiem ļaut nožūt.

Lietojot pupiem, kam ir ādas ievainojumi, var tikt kavēta brūču dzīšana. Ieteicams pārtraukt lietošanu līdz sadzīst ievainojumi. Organisko vielu (strutu, asins utt.) klātbūtne var mazināt dezinficējošā hlorheksidīna iedarbību.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja tās iekļūst acī, izskalojiet to ar tīru, tekošu ūdeni un vērsieties pēc ārsta padoma.

Nejaušas norīšanas gadījumā lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc ārsta palīdzības.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzīvnieku barības.

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

Ja produkts tiek izmantots kā aerosols, novērst strādāšanu piesmidzinātajā gaisā.

Personām, kam ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Pupa peldes aktīvās sastāvdaļas veida izmaiņa var retos gadījumos izraisīt ādas kairinājumu.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nesaderības ir minētas apakšpunktā 6.2.

4.9 Devas un lietošanas veids

Produkts ir gatavs lietošanai pēc slaukšanas, un tas jālieto līdz divām reizēm dienā.

Katrai govij izlietojiet vismaz 5 ml vienā reizē.

Iemērciet katras govīs pupas nekavējoties pēc slaukšanas. Noteikti iemērciet trīs ceturtdaļas pupa.

Kad nepieciešams, iemērkšanas trauks vai pulverizators jāpiepilda no jauna.

Ja izmantojat parasto iemērkšanas trauku vai pulverizatoru, katrā slaukšanas reizē jālieto svaigs šķīdums. Iemērkšanas trauks vai pulverizators jāiztukšo, jāiztīra un jāizskalo pēc katras slaukšanas reizes vai slaukšanas laikā, kad tiek piesārņots. Nepārlejiat atlikušo šķīdumu no iemērkšanas trauka vai pulverizatora atpakaļ oriģinālajā tvertnē. Nelietojiet produktu slaukšanas aprīkojuma tīrīšanai un/vai sterilizēšanai.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojams. Šīs veterinārās zāles paredzētas lokālai lietošanai un ievērojama to uzsūkšanās nenotiek.

4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļa un blakuproduktiem: nulle dienas.

Piens: nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Dermatoloģiski, antiseptiski, dezinficējoši līdzekļi, kas veidoti uz hlorheksidīna bāzes.

ATĶ vet kods: QD08AC02

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Hlorheksidīns ir bis-biguanīdu antiseptisks līdzeklis. Hlorheksidīnam ir plašs aktivitātes spektrs. Tas saskarē spēj ātri un pilnībā iznīcināt praktiski visas veģetatīvās baktērijas. Hlorheksidīns iznīcina sēnītes un novērš bakteriālo sporu augšanu.

Hlorheksidīns izraisa šūnu sienīšu sabrukšanu. Tas rada caurlaidības izmaiņas vai zudumu un bojājumus. Šūnu bojāejas rezultātā notiek starpšūnu sastāvdaļu noplūde. Notiek ļoti zemas koncentrācijas šūnu sastāvdaļu atbrīvošanās. Augstas koncentrācijas hlorheksidīns izraisa starpšūnu sastāvdaļu sarecēšanu. Elektrostatiskās mijiedarbības ar skābju fosfolipīdiem dēļ primārā iedarbības vieta ir citoplazmatiskā membrāna.

Uz šo hlorheksidīna iedarbību ir uzņēmīgas visas veģetatīvās baktērijas, un šajā jomā nav dokumentēts zināms rezistences mehānisms.

Hlorheksidīns ir antiseptisks līdzeklis. Atbilstoši Eiropas standartiem EN 1656 (lauka apstākļos) Kenocidin ir pārbaudīta reakcija ar *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Enterococcus hirae*, *E. coli*, *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *Corynebacterium bovis*, *Streptococcus bovis*, *Klebsiella*, *Citrobacter*, *Enterobacter*.

5.2 Farmakokinētiskie dati

Hlorheksidīns pēc lokālas lietošanas ievērojami neuzsūcas ādā, līdz ar to sistēmiska farmakokinētiska darbība nav indicēta

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Briljantzilais 85% (E133)

Glicerīns

Alantoīns

Izopropilspirts

Makrogola stearāts

Piparmētras eļļa, daļēji brīvs no mentola

Citronskābes monohidrāts

30% nātrija hidroksīda šķīdums

Attīrīts ūdens

6.2 Nesaderība

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram, ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskie anjoni, tāpēc nesajaukt ar krāna ūdeni, citām ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citiem produktiem, kas paredzēti pupu un tesmeņa kopšanai.

6.3 Derīguma termiņš

Veterinārā medicīnas produkta derīguma termiņš pēc iepakojšanas tirdzniecībai: 18 mēneši.

Derīguma termiņš pēc iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā .

Sargāt no sasalšanas.

Ja veterinārās zāles ir sasalušas, atkausēt siltā vietā un pirms lietošanas labi sakratīt.

Sargāt no gaismas.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

1 litra balti, liela blīvuma polietilēna multidevu konteineri (HDPE) ar HDPE aizskrūvējamajiem vākiem un gredzenveida aizslēgiem.

5,10,20,25,60 un 200* litra zilas, HDPE multidevu konteineri (HDPE) ar HDPE aizskrūvējamajiem vākiem un gredzenveida aizslēgiem. 200 litru norādes apzīmogojums ir sarkans.

Ne visi iepakojumu izmēri var tikt izplatīti.

*200 litru konteiners nav paredzēts, lai to atgrieztu atkārtotai iepildīšanai

6.6 Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkts nedrīkst iekļūt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdens organismus.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Beļģija

Tāl. +32 (0) 57 21 78 77

Fakss. +32 (0) 57 21 78 79

e-pasts: info@cidlines.com

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/MRP/12/0019

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 02/03/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2021

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikts.