

**ЛИСТОВКА:**  
ГЛЮКОКОФЕИН® инжекционен разтвор  
за Говеда, коне, овце, кози и кучета.

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА  
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

ВЕТПРОМ АД,  
ул. „Отец Паисий“ №26,  
2400 гр. Радомир,  
България

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

ГЛЮКОКОФЕИН® инжекционен разтвор  
GLUCOCOFEIN® solutio pro injectionibus

**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСПИРИЕНТИТЕ**

**Активни субстанции:**

Glucose Monohydrate	20.0 g/100 ml
Caffeine Sodium Benzoate	0.8 g/100 ml

**Експириенти:**

Water for injections

**4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

При инфекциозни и неинфекциозни заболявания, фуражни интоксикации, при отравяния с вещества подтискащи ЦНС, при остри сърдечно-съдови разстройства, при и след прекарани тежки заболявания, състояние на треска, слабост, изтощение, при родилна пареза при крави, следродилен сепсис, при отоци и възпаления в областта на главния и гръбначния мозък и техните обвивки и на копитата.

**5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от експириентите.

Да не се използва при остри миодегенерации на сърдечния мускул, некомпенсираны пороци; хипергликемия.

**6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

При висока скорост на инфузията е възможна е поява на повищена възбудимост, тахикардия и аритмия, повищена възбудимост, мускулен трепор и засилена диуреза.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 третирани животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 третирани животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 третирани животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Говеда, коне, овце, кози и кучета.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ**

### **Доза:**

За говеда и коне - 200-300 ml 1-2 пъти дневно; за овце и кози - по 50 ml 1-2 пъти дневно; за кучета - по 10-30 ml 1-2 пъти дневно.

### **Начин на прилагане:**

Интравенозно (бавно).

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Винаги използвайте ГЛЮКОКОФЕИН® инжекционен разтвор точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

## **10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:  
Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицинският продукт на животните:  
Не е приложимо.

### Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация

### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При употреба на по-високи дози процесите на възбудждане ирадират, което може да се изрази в ускорена реакция при дразнене, в моторна възбуда, беспокойство и безсъние. Това влияние на кофеина се сменя след това със затормозяване, с намалена функционална дейност (задпределно

задържане). В големи дози кофеинът предизвиква хипергликемия и глюкозурия, поради увеличено отделяне на адреналин. Наблюдават се гърчове, треперене на мускулатурата. Мерки при предозиране: При поява на такава клинична картина се преустановява инфузията и се прилага симптоматично лечение.

**Основни несъвместимости:**

При съвместно прилагане на кофеинсъдържащи продукти и бромиди в подходящи дози, може да се постигне балансиране между възбудните и задръжните процеси (ако съотношението между тях е било нарушено) и да се лекуват неврози и кортико-висцерални заболявания (бром-кофеинова терапия). При едновременното прилагане на продукта със сънотворни – намалява тяхното действие; с нестероидни противовъзпалителни средства – засилва ефекта им.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

01/2023

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

**Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ**  
*ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*