



## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**FALTSCHACHTEL**

**50 / 100 / 250 ml Flaschen**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin

**2. WIRKSTOFF(E)**

Tylosin..... 200 000 I.E./ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

100 ml

250 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

**7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder langsame intravenöse Anwendung (nur bei Rindern).

**Rinder:**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

**Schweine (über 25 kg):**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Milch: 108 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 16 Tage

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeitsdauer nach Anbruch: 28 Tage

Nach erstmaligem Anbrechen verwendbar bis:

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht über 25°C lagern.

Nicht einfrieren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage.

**13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Vetoquinol GmbH  
Reichenbachstr. 1  
D-85737 Ismaning

AT: Vetoquinol Österreich GmbH  
Gußhausstraße 14/5  
A-1040 Wien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 402211.00.00

AT: Z.Nr.: 836829

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Etikett 100 ml und 250 ml Flaschen**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin

**2. WIRKSTOFF(E)**

Tylosin..... 200 000 I.E./ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

**4. PACKUNGSGRÖSSE**

100 ml

250 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

**7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder langsame intravenöse Anwendung (nur bei Rindern).

**Rinder:**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

**Schweine (über 25 kg):**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit(en):

Rind:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Milch: 108 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 16 Tage

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeitsdauer nach Anbruch: 28 Tage

Nach erstmaligem Anbrechen verwendbar bis:

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht über 25°C lagern.

Nicht einfrieren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

**13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 402211.00.00

AT: Z.Nr.: 836829

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett 50 ml Flasche

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin

### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Tylosin..... 200 000 I.E./ml

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

i.m. oder i.v.

**Rinder:**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

**Schweine (über 25 kg):**

2,5 bis 5 ml Lösung pro 100 kg Körpergewicht pro Tag über 3 Tage.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Milch: 108 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 16 Tage

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.: {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP:

Haltbarkeitsdauer nach Anbruch: 28 Tage

Nach erstmaligem Anbrechen verwendbar bis:

**8. VERMERK " FÜR TIERE"**

Für Tiere