

PAKENDI INFOLEHT

1. Veterinaarravimi nimetus

Parvoruvax, süstesuspensioon sigadele

2. Koostis

Üks annus (2 ml) sisaldab:

Sigade inaktiveeritud parvoviirus, tüvi K-22	≥ 2 HAI U*
<i>Erysipelotrix rhusiopathiae</i> , serotüüp 2	≥ 1 ELISA ühik**

* Antigeeni kogus, mille manustamisel tekib merisigadel hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade tiiter tasemel 1 log₁₀.

** Antigeeni kogus, mille manustamisel tekib loomal serokonversiooni indeks (ELISA järgi) vastavalt Ph Eur.

Abiained:

Alumiiniumhüdroksiid	4,2 mg
----------------------	--------

Tiomersaal	0,2 mg
------------	--------

Valge piimjas suspensioon pärast loksutamist.

3. Loomaliigid

Siga.

4. Näidustused

Sigade aktiivne immuniseerimine parvoviroosi ja punataudi vastu.

Immuunsuse teke: 2 - 3 nädalat pärast esmast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: parvoviroosi vastu 9 kuud ja punataudi vastu 11 kuud pärast vaktsineerimist.

5. Vastunäidustused

Ei ole.

6. Erihoiatused

Erihoiatused

Maternaalsete antikehade olemasolu korral ei tohi läbi viia esmast vaktsineerimist sigade parvoviroosi vastu enne sigade 6 kuu vanuseks saamist.

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Vaktsineerimine ei ole soovitatav esimese 3 nädala jooksul pärast paaritamist või seemendamist.

Koostoime teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Vaktsiini kahekordse annuse manustamisel ei täheldatud muid kõrvaltoimeid, kui on mainitud lõigus 7 „Kõrvaltoimed“.

Kokkusobimatus

Mitte segada teiste vaktsiinide ega immunoloogiliste ravimitega.

Ettevaatusabinõud keskkonna kaitseks

Ei rakendata.

7. Kõrvaltoimed

Siga:

Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud):	Ülitundlikkusreaktsioon ¹
--	--------------------------------------

¹Eelkõige nendel sigadel, kes on punataudi nakkusele vastuvõtlikud. Sellisel juhul tuleb rakendada sümptomaatilist ravi (näiteks manustada adrenaliini).

8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod

Intramuskulaarne manustamine.

Vähemalt 6 kuu vanustele loomadele süstitakse üks annus (2 ml) intramuskulaarselt sügavale kaelalihastesse kõrva taga.

Esmane vaktsineerimiskuur

Kaks annust 3...4-nädalase intervalliga, teine annus vähemalt 2 nädalat enne paaritamist või seemendamist.

Vaktsiini kasutatakse ainult kordusvaktsineerimiseks, kui sigade parvoviroosi vastaste maternaalsete antikehade tase ei ole teada:

Kordusvaktsineerimine

Üks annus iga kuue kuu järel (emistel võõrutamisele eelneva nädala jooksul).

9. Soovitused õige manustamise osas

Enne kasutamist loksutada.

Rakendada tavalisi aseptilisi meetmeid.

10. Keeluajad

0 päeva.

11. Säilitamise eritingimused

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C ... 8 °C).

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast Exp. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: kohe kasutamiseks.

12. Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

13. Veterinaarravimite klassifikatsioon

Retseptiravim.

14. Müügiloo number (numbrid) ja pakendi suurused

Müügiloo number: 1202

Pakendi suurused:

10 ml (5-annuseline) pudel, 1 pudel karbis.

50 ml (25-annuseline) pudel, 1 pudel karbis.

100 ml (50-annuseline) pudel, 1 pudel karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

15. Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev

November 2024

Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktandmed

Müügiloo hoidja ning kontaktandmed võimalikest kõrvaltoimetest teatamiseks:

Ceva Santé Animale

10, av. de la Ballastière

33500 Libourne

Prantsusmaa

E-mail: pharmacovigilance@ceva.com

Telefon: +800 3522 1151

Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja:

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budapest Szállás u. 5.

Ungari