

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Kartonschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tralieve 50 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Tramadol 43,9 mg
(entspricht 50 mg Tramadolhydrochlorid)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 10 ml
1 x 20 ml
1 x 50 ml
6 x 10 ml
6 x 20 ml
6 x 50 ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse oder intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 8 Wochen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Le Vet. Beheer B.V.

14. ZULASSUNGSNR.

BE-V532764

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflaschen aus Glas mit 10, 20 oder 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tralieve



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Tramadolhydrochlorid 50 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 8 Wochen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...