

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1,2,3,4,6 und 24 Pipetten – Pipette mit kurzem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg

2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 0,4 ml Lösung enthält:
Wirkstoff(e): 40 mg Imidacloprid, 200 mg Permethrin

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette (1x 0,4 ml)
2 Pipetten (2x 0,4 ml)
3 Pipetten (3x 0,4 ml)
4 Pipetten (4x 0,4 ml)
6 Pipetten (6x 0,4 ml)
24 Pipetten (24x 0,4 ml)

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.
- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (FAD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).
- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt entscheidend zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Folienbeutel mit den Pipettenblistern ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

[Anwendungsschema als Piktogramm entsprechend der Pipettenstärke]



8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 1,5 kg Körpergewicht.

Nicht bei Katzen anwenden.



10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Folienbeutels oder vor EXP verwenden, je nachdem welches Datum kürzer ist.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven
Deutschland

AT: Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen

Hersteller:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 400738.00.00

AT: Z.Nr.: 8-00601

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot



[Abbildung Pipette, Hund, Bayer Logo]

SONSTIGE ANGABEN

Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.

Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.

Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1,2,3,4,6 und 24 Pipetten – Pipette mit langem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg

2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 0,4 ml Lösung enthält:

Wirkstoff (e):

40 mg Imidacloprid

200 mg Permethrin

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette (1x 0,4 ml)
2 Pipetten (2x 0,4 ml)
3 Pipetten (3x 0,4 ml)
4 Pipetten (4x 0,4 ml)
6 Pipetten (6x 0,4 ml)
24 Pipetten (24x 0,4 ml)

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.
- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (FAD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).
- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt entscheidend zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Der Folienbeutel ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

[Anwendungsschema als Piktogramm entsprechend der Produktstärke]



8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 1,5 kg Körpergewicht.
Nicht bei Katzen anwenden.



10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.
Nach Öffnen des Aluminiumbeutels ist der gesamte Inhalt auf die Haut des Hundes aufzutropfen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig
AT: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven
Deutschland

AT: Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen

Hersteller:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 400738.00.00
AT: Z.Nr.: 8-00601

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

[Abbildung Pipette, Hund, Bayer Logo]

SONSTIGE ANGABEN

Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.
Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.
Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett Pipette (international) - Pipette mit kurzem und langem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

100 mg/ml Imidacloprid
500 mg/ml Permethrin

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

0,4 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

5. WARTEZEIT(EN)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

8. VERMERK "NUR FÜR TIERE"



≤ 4 kg

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]





ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Blister (international) - Pipette mit kurzem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. ZULASSUNGSINHABER



3. VERFALLDATUM

4. CHARGENBEZEICHNUNG

5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

[Pictogramm Hund]



≤ 4 kg
0.4 ml

[Pictogramm Pipette]



[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Folienbeutel (international) - Pipette mit kurzem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. NAME DES ZULASSUNGSINHABER



3. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

[Pictogramm Hund]

Pipette mit kurzem Hals



≤ 4 kg
0.4 ml



[Pictogramm Pipette]

WEITERE HINWEISE

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Folienbeutel - Pipette mit langem Hals

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. NAME DES ZULASSUNGSINHABER



3. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"



≤ 4 kg
0.4 ml



WEITERE HINWEISE

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Nach Öffnen des Aluminiumbeutels ist der gesamte Inhalt auf die Haut des Hundes aufzutropfen.