

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos met 3 pipetten (6, 18, 30 pipetten)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE Combo Spot On Clinic Pack Kat
Fipronilum 10% w/v - (S) Methoprenum 12% w/v

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Samenstelling

Fipronilum.....	50,00 mg
(S)-methoprenum.....	60,00 mg
Butylhydroxyanisolum (E320).....	0,10 mg
Butylhydroxytoluenum (E321).....	0,05 mg
Excipient:	q.s 0,5 ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

3 pipetten van 0,5 ml
6 pipetten van 0,5 ml
18 pipetten van 0,5 ml
30 pipetten van 0,5 ml

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten
Fretten

6. INDICATIES

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Spot on

METHODE VAN TOEDIENING

- 1 Neem de pipet uit de verpakking.
- 2 Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af.
- 3 De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.

8. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK

Alleen voor uitwendig gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet bewaren boven 25 °C.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

16. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V429642

BE-V576933

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Blisterkaart met 1 pipet****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE Combo Spot On Clinic Pack Kat
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Fipronilum
(S)-methoprenum

3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1 pipet van 0,5 ml

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten
Fretten

6. INDICATIES

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Spot on
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJNEN

Niet van toepassing.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet bewaren boven 25 °C.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

16. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V429642

BE-V576933

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**1 pipet****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE Combo Clinic Pack

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Fipronilum 50 mg – (S)-Methoprenum 60 mg

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

0,5 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN):*Pictogram of a drop of product falling from a pipette on the skin of the animal thus showing the route of administration.***5. WACHTTERMIJNEN****6. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”*Pictogram of a cat and a ferret indicating the veterinary use.**Pictogram of a cat and a ferret indicating the target species.*

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**Tekst op de blister van 3 pipetten in de doos van 3 of 6, 18, 30 pipetten****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE Combo Spot On Clinic Pack Kat
Fipronilum – (S)-Methoprenum

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

logo Boehringer Ingelheim

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

4. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad Us. Vet.

6. OVERIGE INFORMATIE

0,5 ml

Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

AANVULLENDE INFORMATIE DIE OP DE BUITENVERPAKKING STAAT**Kartonnen doos met 3 pipetten (6, 18, 30 pipetten)****Doos met 1 pipet (enkel gemarkeerde tekst)**

Doodt vlooien op uw kat en beschermt tegen herbesmetting gedurende 4 weken.

Verhindert de ontwikkeling van eieren, larven en poppen van vlooien (gedurende 6 weken bij katten), en voorkomt zo de besmetting van de omgeving van de behandelde dieren gedurende dezelfde periode.

Doodt teken op uw kat en beschermt tegen herbesmetting tot 2 weken.

Doodt bijtende luizen op uw kat.

Kan gebruikt worden bij katten als onderdeel van een behandelingsschema ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

Voorkomt de besmetting van de omgeving van het behandelde dier door onvolwassen stadia van de vlo.

Doodt vlooien op uw fret en beschermt tegen herbesmetting gedurende 4 weken.

Doodt teken op uw fret en beschermt tegen herbesmetting tot 4 weken

(iconen)