

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR CAJA

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Parte delantera: REMUVET 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros

Parte trasera: REMUVET 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada pipeta de 2,5 ml contiene:

Imidacloprid 250 mg

Permetrina 1250 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 2,5 ml
2 x 2,5 ml
3 x 2,5 ml
4 x 2,5 ml
6 x 2,5 ml
12 x 2,5 ml
24 x 2,5 ml

4. ESPECIES DE DESTINO



10 - 25 kg

5. INDICACIONES DE USO

[En las cajas de cartón este texto solo figura en la parte delantera.]

- Elimina garrapatas, pulgas y piojos masticadores
- Repele garrapatas, mosquitos, flebótomos y moscas de los establos
- Reduce el riesgo de transmisión de leishmaniosis canina y ehrlichiosis canina

Pictogramas de 6 parásitos: garrapatas, pulgas, piojos masticadores, mosquitos, flebótomos y moscas de los establos

[En las cajas de cartón este texto solo figura en la parte trasera.]

- Tratamiento y prevención de pulgas durante 4 semanas; puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento contra la dermatitis alérgica por picaduras de pulga (DAPP).
- Elimina piojos masticadores.
- Repele y elimina garrapatas durante 3 o 4 semanas según la especie de garrapata. Las garrapatas que ya estén adheridas al perro podrían no morir dentro de los dos primeros días después del tratamiento, por lo que podrían permanecer adheridas y visibles. Por tanto, en el momento del tratamiento se recomienda retirar las garrapatas que aún no estén adheridas para evitar que se adhieran al animal e ingieran su sangre.
- Repele flebótomos, mosquitos y moscas de los establos entre 2 y 4 semanas
- Reduce el riesgo de transmisión de leishmaniosis canina (hasta 3 semanas) y ehrlichiosis canina (hasta 4 semanas)

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal puntual (spot-on), únicamente para uso externo.
Cada pipeta debe usarse únicamente en un perro.



Conserva la eficacia, aunque el perro se moje. Con efecto larvicida contra las pulgas situadas en el entorno inmediato de los perros tratados. No usar en cachorros de menos de 7 semanas o en perros de menos de 10 kg de peso. En caso de gestación o lactancia, usar únicamente siguiendo el consejo del veterinario.

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No refrigerar o congelar.
Conservar en el embalaje exterior con objeto de proteger las pipetas de la luz y la humedad.

10. LA ADVERTENCIA «LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR»

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN «USO VETERINARIO»

Uso veterinario.



12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE «MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS»

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Beaphar BV.

Representante local:



14. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4286 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Sobre

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

REMUJET



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

250 mg Imidacloprid(e)
1250 mg Permethrin(e)
2,5 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierta, usar la pipeta de inmediato



DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Pipeta

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

REMUJET



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

250 mg Imidacloprid(e)
1250 mg Permethrin(e)
2,5 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

