

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nafpenzal T Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Euterinjektor mit 3 g Salbe enthält:

Benzylpenicillin-Procaïn	300 mg
Nafcillin-Natrium	100 mg
Dihydrostreptomycin als Sulfat	100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 Injektoren zu je 3 g im Beutel und 4 Reinigungstücher
20 Injektoren zu je 3 g im Beutel und 20 Reinigungstücher

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (trockenstehende Milchkühe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramammären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe:	14 Tage
Milch: Applikation vor dem 35 Tage vor der Geburt:	5 Tage
Applikation innerhalb 35 Tagen vor der Geburt:	40 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 17.427

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Injektor 3 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nafpenzal T Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder Euterinjektor mit 3 g enthält:

Benzylpenicillin-Procaïn	300 mg
Nafcillin-Natrium	100 mg
Dihydrostreptomycin als Sulfat	100 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}