

ETIKETTERING EN BIJSLUITER

GEGEVENS DIE OP <DE BUITENVERPAKKING> <EN> <DE PRIMAIRE VERPAKKING> MOETEN WORDEN VERMELD>

{AARD/TYPE}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Kenocidin Spray and Dip Chloorhexidine digluconaat 5mg/ml, tepeldip oplossing / tepelspray oplossing voor runderen (melkkoeien)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Chloorhexidine digluconaat: 5.00 mg/ml (Equivalent aan chloorhexidine: 2.815 mg/ml)

Briljantblauw 85% (E133): 0.035 mg/ml

Glycerol: 60.00 mg/ml

Allantoïne: 1.00 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tepeldip oplossing / Tepelspray oplossing

Blauwe vloeibare oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (melkkoeien)

6. INDICATIE(S)

Ontsmetten van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij melkkoeien. Voor het behouden van een goede conditie van de speenhuid en speensfincter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening op de tepel

Het product is een gebruiksklaar speedipmiddel of speedipspraymiddel, toegepast twee maal per dag na het melken. Gebruik ten minste 5 ml per koe per applicatie.

Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drie vierde van zijn totale lengte wordt afgedekt. Als alternatief kan de elke speen volledig besprayed worden onmiddellijk na elke melkbeurt.

De dipbeker of sprayer moet indien nodig bijgevuld worden.

Als er een gemeenschappelijke dipbeker of sprayer wordt gebruikt voor de toepassing, moet er altijd een nieuwe oplossing worden gemaakt bij elke melkbeurt. De dipbeker of sprayer moet worden geledigd, gereinigd en gespoeld na elke melkbeurt of wanneer de beker of sprayer wordt verontreinigd tijdens het melken.

De resterende oplossing niet terug gieten in de originele verpakking. Geen gebruik maken van het product voor het reinigen en / of ontsmetten van melkapparatuur.

8. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: Nul dagen

Melk: Nul uren

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Zorg ervoor dat de uier en spenen proper en droog zijn vóór de volgende melkbeurt.

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Chloorhexidine kan geïnactiveerd worden door anionische en niet ionische surfactanten (bijv. zepen, zelfs natuurlijke) of anorganische anionen, dus niet vermengen met leiding water, andere chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en andere producten voor speen-en uierverzorging.

Dit diergeneesmiddel is voor toediening op de tepel, significante absorptie treedt niet op.

- **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Als symptomen van ziekte verschijnen, raadpleeg dan een dierenarts.

Enkel voor uitwendig gebruik.

Bij aanwezigheid van letsels aan de spenen, kan het gebruik van dit product leiden tot vertraging van het herstel. Het wordt aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de spenen hersteld zijn.

De aanwezigheid van organisch materiaal (etter, bloed, enz.) kan de werking van het ontsmettingsmiddel chloorhexidine beperken.

Bij vriestemperaturen, de spenen laten drogen vooraleer de koeien buiten te laten.

Het product laten drogen vooraleer het vee aan natte (regenachtige), koude of winderige omstandigheden bloot te stellen.

- **Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren toedient**

Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met stromend water spoelen en medisch advies inwinnen.

In geval van accidentele inname, grote hoeveelheden water drinken en onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Verwijderd houden van voeding en diervoeding.

Handen wassen na gebruik.

Wanneer het product wordt gebruikt als een spray, vermijd werken in spray nevel.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor chloorhexidine, moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden

- **Bijwerkingen (frequentie en ernst)**

Verandering van het type werkzame bestanddeel speen dip kan in zeer zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze etiket worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

- **Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij een gekende overgevoeligheid voor chloorhexidine of de hulpstoffen.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP maand/jaar

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

Uiterste gebruiksdatum: ____/____/____

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Houd de container zorgvuldig gesloten.

Vrijwaren tegen bevroering.

Indien het product bevroren is, het product laten dooien in een warme plaats en goed schudden voor gebruik.

Bescherm tegen licht.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

De containers van 200 liter mogen niet teruggeven worden om opnieuw gevuld te worden.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

SCHADELIJK VOOR VISSSEN EN waterorganismen. Geen verontreinig vijvers, waterlopen of sloten met het product of gebruikte container.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik . Vrije aflevering.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

België

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V393592

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot