

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOEQUIN FH, injekcinė emulsija arkliams

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvintų arklių gripo viruso padermių:

A/Equi 2/Brno 08 (amerikinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

A/Equi 2/Morava 95 (europinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

inaktyvinto 1 tipo arklių herpes viruso (EHV-1)

ne mažiau kaip 2,1 log₁₀ VNI²,

¹ hemagliutinacijos slopinimo tyrimu nustatytas specifinių antikūnų kiekio geometrinis vidurkis jūrų kiaulyčių kraujo serume,

² viruso neutralizavimo indeksas žiurkėnų kraujo serume;

adjuvanto:

aliejinio adjuvanto (Montanide ISA 35 VG)

0,25 ml;

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio

0,1 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1. p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinė emulsija.

Vakcina yra baltas aliejiingas skystis su lengvai suplakamomis nuosėdomis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Arkliai.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliams aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kvėpavimo takų infekcijų pasireiškimą ir klinikinius požymius, sukeliamus arklių gripo viruso ir 1 tipo arklių herpes viruso (EHV-1).

Kumelėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kumelių abortų skaičių, kuriuos sukelia 1 tipo arklių herpes virusas (EHV-1).

Susidaręs imunitetas buvo patvirtintas užkrečiant Brno 08 padermės arklių gripo virusu, o Morava 95 padermės atveju – serologiškai.

Imuniteto abiejų vakcinos gripo padermių virusams trukmė nustatyta serologiškai.

Gripas:
imunitetas susidaro per 2 sav. nuo pirminės vakcinacijos,
imunitetas trunka 6 mėn. po revakcinacijos.

tipo 1 herpes virusas:
imunitetas susidaro per 2 sav. nuo pirminės vakcinacijos,
imunitetas trunka 6 mėn. po revakcinacijos.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Siekiant sumažinti infekcijos riziką, vakcinuoti reikia visus ūkyje laikomus arklius. Prieš pervedant arklius į kitas bandas ar arklides, arba prieš varžybas, reikia atlikti bent jau pirminę vakcinaciją ir išlaukti 14 dienų, kad susidarytų reikiamas imunitetas. Norint sudaryti ir palaikyti imunitetą arklių herpes virusui ir arklių gripo virusui, būtina reguliariai vakcinuoti visus kartu laikomus arklius ir laikytis nurodytų terminų. Visus į bandą atvedamus nevakcinuotus arklius rekomenduotina karantino laikotarpiu vakcinuoti bent pirmine vakcinacija ir po to išlaukti 14 dienų, kad susidarytų reikiamas imunitetas. Sergančius arklius su kvėpavimo takų ligos požymiais reikia laikyti atskirai nuo sveikų gyvūnų.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Naudotojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina, SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštumas ar sausgyslė.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Dėl vakcinacijos gali būti nedažnai stebimas laikinas temperatūros pakilimas (daugiausiai 0,5 °C, trunkantis iki 3 dienų). Vietinė reakcija (karštas ir skausmingas patinimas injekcijos vietoje, trunkantis ne ilgiau kaip 3 dienas) yra reta.

Labai retai vakcina gali sukelti anafilaksinę reakciją. Tokiu atveju reikia nedelsiant taikyti simptominių gydymą.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo metu.

Veterinarinio vaisto saugumas laktacijos metu nenustatytas.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant vienu metu su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vakcinos dozė: 1 ml.

Vakciną (1 ml) reikia švirkšti giliai į raumenis.

Prieš naudojimą vakcinai reikia leisti atšilti iki 15–25 °C temperatūros ir gerai supurtyti.

Vakcinacijos schema

Pirminė vakcinacija nuo arklių gripo ir herpes virusų

Pirmą kartą vakcinuoti reikia 6 mėn. amžiaus gyvūnus, antrą kartą – po 4 sav.

Revakcinacija nuo arklių gripo ir herpes virusų

Pirmą kartą revakcinuoti (trečia doze) reikia praėjus 3 mėn. nuo pirminės vakcinacijos, vėliau revakcinuojant kas 6 mėn.

Kumelių kumelių vakcinacija

Norint sumažinti arklių herpes viruso sukeltų abortų skaičių, vaikingas kumelės reikia vakcinuoti viena vakcinos doze antrą mėnesį po kergimo, vakcinaciją kartoti penktą arba šeštą mėnesį ir vėliau – devintą kumelingumo mėnesį.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Netaikytina.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: inaktyvintos virusinės vakcinos arkliams.

ATC kodas: QI05AA04.

Aktyviai imunizuoti nuo arklių gripo ir arklių herpes virusų.

Į gyvūno organizmą patekusios veikliosios medžiagos sukelia aktyvų imuninį atsaką, pasireiškiantį vietinio ir sisteminio humoralinio imuniteto susidarymu ir citotoksinių T-limfocitų aktyvumu.

Aktyvus imunitetas susidaro ne vėliau kaip per 2 sav. nuo pagal rekomenduojamą vakcinacijos schemą atliktos pirminės vakcinacijos.

Kumeliukų ir suaugusių arklių imunitetas arklių herpes virusui ir arklių gripo virusui trunka ne trumpiau nei 6 mėn. po trečiosios vakcinacijos ir kitų revakcinacijų. Norint užtikrinti ilgalaikį imunitetą, būtina laikytis rekomenduojamos vakcinacijos schemos.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Montanide ISA 35 VG,
tiomersalis,
natrio chloridas,
kalio chloridas,
kalio divandenilio fosfatas,
dinatrio vandenilio fosfato dodekahidratas,
injekcinis vanduo,
natrio hidroksidas pH suregulavimui.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 18 mėn.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 10 val.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Saugoti nuo šviesos.
Laikyti sausoje vietoje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Vakcina tiekama stikliniuose I hidrolitinės klasės stiklo buteliukuose, hermetiškai užkimštuose praduriamaais guminiiais kamšteliais ir apgaubtuose aliumininiais gaubteliais.
Prie kiekvienos pakuotės pridedamas informacinis lapelis.
Vakcinos buteliukai dedami į kartonines dėžutes. Didesnių pakuočių buteliukai dedami į PVC pakuotę.
Pakuotės dydis: 2 x 1 dozė, 5 x 1 dozė, 10 x 1 dozė,
1 x 5 dozės, 10 x 5 dozės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané,
ČEKIJOS RESPUBLIKA

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/14/2265/001-005

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2014-11-27

Perregistravimo data 2018-02-09

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2018-02-09

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{Kartoninė dėžutė 1 x 5 dozės, plastikinė dėžutė 2 x 1 dozė, 5 x 1 dozė, 10 x 1 dozė, 10 x 5 dozės}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOEQUIN FH, injekcinė emulsija arkliams

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvintų arklių gripo viruso padermių:

A/Equi 2/Brno 08 (amerikinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

A/Equi 2/Morava 95 (europinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

inaktyvinto 1 tipo arklių herpes viruso (EHV-1)

ne mažiau kaip 2,1 log₁₀ VNI².

3. VAISTO FORMA

Injekcinė emulsija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 x 1 dozė

5 x 1 dozė

10 x 1 dozė

1 x 5 dozės

10 x 5 dozės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAI

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsitiktinai įsišvirkšti pavojinga.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 10 val.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Saugoti nuo šviesos. Laikyti sausoje vietoje.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, ČEKIJOS RESPUBLIKA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/14/2265/001

LT/2/14/2265/002

LT/2/14/2265/003

LT/2/14/2265/004

LT/2/14/2265/005

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
{1 dozės ir 5 dozių buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOEQUIN FH, injekcinė emulsija arkliams

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml
5 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

i.m.

5. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti per 10 val.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
BIOEQUIN FH, injekcinė emulsija arkliams

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Bioveta, a. s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
ČEKIJOS RESPUBLIKA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOEQUIN FH, injekcinė emulsija arkliams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinės dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvintų arklių gripo viruso padermių:

A/Equi 2/Brno 08 (amerikinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

A/Equi 2/Morava 95 (europinio tipo) H3N8

ne mažiau kaip 6,0 log₂ HIT¹,

inaktyvinto 1 tipo arklių herpes viruso (EHV-1)

ne mažiau kaip 2,1 log₁₀ VNI²,

¹ hemagliutinacijos slopinimo tyrimu nustatytas specifinių antikūnų kiekio geometrinis vidurkis jūrų kiaulyčių kraujo serume,

² viruso neutralizavimo indeksas žiurkėnų kraujo serume;

adjuvanto:

aliejinio adjuvanto (Montanide ISA 35 VG)

0,25 ml;

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio

0,1 mg.

Vakcina yra baltas aliejiingas skystis su lengvai suplakamomis nuosėdomis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kvėpavimo takų infekcijų pasireiškimą ir klinikinius požymius, sukeliamus arklių gripo viruso ir 1 tipo arklių herpes viruso (EHV-1).

Kumelėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kumelių abortų skaičių, kuriuos sukelia 1 tipo arklių herpes virusai (EHV-1).

Susidaręs imunitetas buvo patvirtintas užkrečiant Brno 08 padermės arklių gripo virusu, o Morava 95 padermės atveju – serologiškai.

Imuniteto abiejų vakcinės gripo padermių virusams trukmė nustatyta serologiškai.

Gripas:

imunitetas susidaro per 2 sav. nuo pirminės vakcinacijos,

imunitetas trunka 6 mėn. po revakcinacijos.

tipo 1 herpes virusas:
imunitetas susidaro per 2 sav. nuo pirminės vakcinacijos,
imunitetas trunka 6 mėn. po revakcinacijos.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Dėl vakcinacijos gali būti nedažnai stebimas laikinas temperatūros pakilimas (daugiausiai 0,5 °C, trunkantis iki 3 dienų). Vietinė reakcija (karštas ir skausmingas patinimas injekcijos vietoje, trunkantis ne ilgiau kaip 3 dienas) yra reta.

Labai retai vakcina gali sukelti anafilaksinę reakciją. Tokiu atveju reikia nedelsiant taikyti simptominių gydymą.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vakcinės dozė: 1 ml.

Vakciną (1 ml) reikia švirkšti giliai į raumenis.

Vakcinacijos schema

Pirminė vakcinacija nuo arklių gripo ir herpes virusų:

Pirmą kartą vakcinuoti reikia 6 mėn. amžiaus gyvūnus, antrą kartą – po 4 sav.

Revakcinacija nuo arklių gripo ir herpes virusų:

Pirmą kartą revakcinuoti (trečia doze) reikia praėjus 3 mėn. nuo pirminės vakcinacijos, vėliau revakcinuojant kas 6 mėn.

Kumelių kumelių vakcinacija

Norint sumažinti arklių herpes viruso sukeltų abortų skaičių, vaikingas kumeles reikia vakcinuoti viena vakcinės doze antrą mėnesį po kergimo, vakcinaciją kartoti penktą arba šeštą mėnesį ir vėliau – devintą kumelingumo mėnesį.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą vakcinai reikia leisti atšilti iki 15–25 °C temperatūros ir gerai supurtyti.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Laikyti sausoje vietoje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 10 val.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Siekiant sumažinti infekcijos riziką, vakcinuoti reikia visus ūkyje laikomus arklius. Prieš pervedant arklius į kitas bandas ar arklides, arba prieš varžybas, reikia atlikti bent jau pirminę vakcinaciją ir išlaukti 14 dienų, kad susidarytų reikiamas imunitetas. Norint sudaryti ir palaikyti imunitetą arklių herpes virusui ir arklių gripo virusui, būtina reguliariai vakcinuoti visus kartu laikomus arklius ir laikytis nurodytų terminų. Visus į bandą atvedamus nevakcinuotus arklius rekomenduotina karantino laikotarpiu vakcinuoti bent pirmine vakcinacija ir po to išlaukti 14 dienų, kad susidarytų reikiamas imunitetas. Sergančius arklius su kvėpavimo takų ligos požymiais reikia laikyti atskirai nuo sveikų gyvūnų.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Naudotojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina, SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu.

Laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas laktacijos metu nenustatytas.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant vienu metu su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

**13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2018-02-09

15. KITA INFORMACIJA

Aktyviai imunizuoti nuo arklių gripo ir arklių herpes virusų.

I gyvūno organizmą patekusios veikliosios medžiagos sukelia aktyvų imuninį atsaką, pasireiškiantį vietinio ir sisteminio humoralinio imuniteto susidarymu ir citotoksinių T-limfocitų aktyvumu.

Aktyvus imunitetas susidaro ne vėliau kaip per 2 sav. nuo pagal rekomenduojamą vakcinacijos schemą atliktos pirminės vakcinacijos.

Kumeliukų ir suaugusių arklių imunitetas arklių herpes virusui ir arklių gripo virusui trunka ne trumpiau nei 6 mėn. po trečiosios vakcinacijos ir kitų revakcinacijų. Norint užtikrinti ilgalaikį imunitetą, būtina laikytis rekomenduojamos vakcinacijos schemos.

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Pakuotės dydis: 2 x 1 dozė, 5 x 1 dozė, 10 x 1 dozė,
 1 x 5 dozės, 10 x 5 dozės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.