

## **B. PACKUNGSBEILAGE**

**GEBRAUCHSINFORMATION**  
Spartrix 10 mg Tabletten für Tauben

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber:

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA  
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B  
Queluz de Baixo  
2730-055 Barcarena  
Portugal

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Spartrix 10 mg Tabletten für Tauben  
Carnidazol

**3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

**Wirkstoff:**

10 mg Carnidazol pro Tablette.

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Durch *Trichomonas gallinae* verursachte Trichomonaden-Infektion bei Tauben.

**5. GEGENANZEIGEN**

Keine.

**6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Tauben, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind.

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

1 Tablette (10 mg) pro erwachsene Taube (20 mg/kg Carnidazol).

Die Tablette wird direkt in den Schnabel verabreicht.

Alle Tauben eines Schlages sollten gleichzeitig behandelt werden, da unbehandelte Tiere eine Quelle der Neuinfektion für die behandelten Tiere sein können.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Tablette wird direkt in den Schnabel verabreicht.

## 10. WARTEZEIT(EN)

Dieses Tierarzneimittel ist ausschließlich für Tauben bestimmt, die nicht zum menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

Der Verzehr von mit diesem Tierarzneimittel behandelten Tauben kann für die Gesundheit des Konsumenten gefährlich sein.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25° C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nach EXP nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Vorzugsweise werden alle Tiere eines Schlages gleichzeitig vor dem Füttern behandelt. Zur Zeit der Behandlung dürfen sich keine Trinkgefäße im Schlag befinden. Erst zwei Stunden nach dem Füttern werden die gründlich gereinigten Trinkgefäße wieder hingestellt. Die Behandlung kann wiederholt werden, wenn die Gefahr einer Neuinfektion droht, zu Beginn der Fortpflanzungsperiode, während der ersten Hälfte der Brutperiode, bei Ankauf neuer Tauben, nach verspäteter Heimkehr usw...

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Der direkte Kontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden. Während der Handhabung des Produkts sollten undurchlässige Handschuhe getragen werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch sind. Unmittelbar nach dem Gebrauch Hände waschen.

Treten nach dem Gebrauch des Produkt Hautreizungen auf, die betroffene Stelle gründlich mit Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Hautreizungen einen Arzt aufsuchen.

Fassen Sie während der Handhabung des Produkts nicht in die Augen. Bei zufälligem Augenkontakt diese sofort gründlich auswaschen. Bei anhaltenden Augenreizungen einen Arzt aufsuchen.

Der Verzehr von mit diesem Tierarzneimittel behandelten Tauben kann für die Gesundheit des Konsumenten gefährlich sein.

### Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während des Brütens ist nicht belegt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)

Bei Anwendung des 32-fachen der therapeutischen Dosis wurde keine Sterblichkeit festgestellt. Drei bis sechs Stunden nach Verabreichung dieser hohen Dosis erbrachen ein paar Tauben ein wenig.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

Dezember 2019

**15. WEITERE ANGABEN**

BE-V090921

50 Tabletten in der Blisterpackung

Verschreibungspflichtig.