

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canishield, 0,77 g ravimkaelarihm väikest ja keskmist kasvu koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 48 cm pikkune ravimkaelarihm (19,2 g) sisaldab:

Toimeaine: Deltametriin 0,77 g

Abiained:

Abiainete ja muude koostisosade kvalitatiivne koostis
Süsinikmust
Epoksiiditud sojaõli
Diisononüüladipaati
Trifenüülfosfaat
Polüvinüülkloriid
Kaltsiumstearaat
Tsinkstearaat
Steariinhape

Must ravimkaelarihm, millest eraldub valget pulbrit.

3. KLIINILISED ANDMED

3.1. Loomaliigid

Koer

3.2. Näidustused loomaliigiti

Veterinaarravimi toime:

- püsiv surmav toime kirpudele (*Ctenocephalides felis*) 16 nädala jooksul;
- püsiv surmav toime puukidele (*Ixodes ricinus*) 6 kuu jooksul;
- liivakärbestele (*Phlebotomus perniciosus*) toitumisvastane ja surmav toime 5,5 kuu jooksul.

3.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel kutsikatel.

Mitte kasutada nahakahjustustega koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada kassidel. Deltametriin on kassidele kahjulik.

3.4. Erihoiatused

Kuna ravimkaelarihma täielik toime avaldub ühe nädala möödumisel, tuleb see loomale kaela ümber panna soovitavalt 1 nädal enne tõenäolist kokkupuudet nakkusega.

Puugid ja liivakärbsed surevad ja kukuvad peremeesloomalt maha reeglina vastavalt 48 ja 24 tunni jooksul pärast kokkupuudet, ilma et oleks jõudnud verd imeda. Pärast ravi ei saa välistada üksikute puukide kinnitumist või üksikuid liivakärbestest hammustusi. Seetõttu ei saa täielikult välistada nakkushaiguste ülekandumise võimalust puukide või liivakärbestega ebasoodsate tingimuste korral.

Kui peres on mitu looma, tuleb kirbunakkuse optimaalseks tõrjeks kõiki majapidamises elavaid koeri ravida samal ajal.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud pesitsevad sageli looma pesakorvis, magamisasemel ja harjumuspärastes puhkekohtades, nagu vaibad ja pehme mööbel. Ulatusliku nakkuse korral ja tõrjemeetmetega alustamisel tuleb neid töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Šampooniga pesemise mõju efektiivsuse kestusele ei ole uuritud.

Juhuslik kokkupuude veega ei vähenda kaelarihma efektiivsust.

Parasiitidevastaste ainete mittevajalik kasutamine või ravimi omaduste kokkuvõttes toodud juhistest kõrvalekaldumine võib suurendada selektiivset survet resistentsuse tekkeks ja viia efektiivsuse vähenemiseni.

Otsus ravimi kasutamise kohta peab põhinema iga koera puhul parasiidiliikide ja nakkuskoormuse kinnitamisel või tekitaja epidemioloogilistel iseärasustel põhineval nakatumisohul.

Koertel esinevatel kirpudel (*C. felis*) ja puukidel (*Rhipicephalus sanguineus*) on täheldatud püretroidide ja eriti deltametriini resistentsust. Toote kasutamisel tuleks võtta arvesse kohalikku teavet sihtparasiitide tundlikkuse kohta, kui see on saadaval.

3.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Nahakahjustuste korral eemaldage ravimkaelarihm, kuni sümptomid on kadunud.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravimi juhuslikul allaneelamisel võivad avalduda kõrvaltoimed, sealhulgas neurotoksiline toime.

Ravimkaelarihma tuleb hoida kuni kasutamiseni kotikeses. Ravimkaelarihma käsitlemise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua. Lastel ei tohi lubada ravimkaelarihmaga mängida ega panna seda suhu. Ravimkaelarihma jäägid või äralõigatud tükid tuleb kohe minema visata. Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed külma veega.

Vältida pikaajalist kokkupuudet ravimkaelarihma või seda kandva koeraga. See puudutab ka voodi jagamist ravimkaelarihma kandvate koertega; eriti oluline on see laste puhul.

Juhuslikul suhu sattumisel või allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Deltametriin võib tundlikel inimestel põhjustada ülitundlikkusega seotud (allergilisi) reaktsioone. Inimesed, kes on deltametriini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga ja ravitud koeraga vältima. Ülitundlikkusreaktsioonide korral pöörduda arsti poole.

Ettevaatusabinõud keskkonna kaitseks

Deltametriin on mürgine veeorganismidele. Ravimkaelarihma kandvaid koeri ei tohi lasta veekogudesse.

3.6. Kõrvaltoimed

Koer

Harv (1 kuni 10 loomal / 10000-st ravitud loomast):	Lokaalsed nahareaktsioonid (kihelus, punetus, karvade väljalangemine) ¹
Väga harv (<1 loomall / 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud):	Muutused käitumises (nt letargia või hüperaktiivsus) ² Seedetrakti sümptomid (oksendamine, kõhulahtisus, liigne süljeeritus) Neuromuskulaarsed häired (nt ataksia, lihasvärinad) ³

¹Kaelal või muudel kehaosadel.

²Sageli seotud nahaärrituse tekkega.

³Sümptomid taanduvad üldjuhul 48 tunni jooksul pärast ravimkaelarihma eemaldamist.

Kui ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, tuleb ravimkaelarihm eemaldada ja on soovitatav konsulteerida veterinaararstiga.

Kõrvatoimetest teatamine on oluline. See võimaldab veterinaarravimi ohutuse pidevat jälgimist. Teatised tuleb eelistatavalt veterinaararsti kaudu saata müügiloa hoidjale või tema kohalikule esindajale või riikliku teavitussüsteemi kaudu riigi pädevale asutusele. Vastavad kontaktandmed on pakendi infolehe lõigus 16.

3.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Veterinaarravimi ohutus tiinuse perioodil ei ole piisavalt tõestatud.

Tiinus ja laktatsiooni periood:

Tiinuse ja imetamise ajal kasutada ravimit ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. Laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet.

3.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos teiste ektoparasitsiididega (püretroidid, organofosfaadid).

3.9. Manustamisviis ja annustamine

Kutaaneks kasutamiseks. Koerale tuleb kaela ümber kinnitada üks ravimkaelarihm. Eemaldada ravimkaelarihm kaitseümbrisest vahetult enne kasutamist. Paigaldada ravimkaelarihm looma kaela ümber mitte liiga lõdvalt ega ka liiga tihedalt: kaelarihma ja koera kaela vahele peaks mahtuma kaks sõrme. Lõigata ära üleliigne osa, mille pikkus ületab 5 cm. Kontrollida regulaarselt, kas rihm on paras, ja reguleerida seda, surudes pannalt ja libistades ravimkaelarihma kergesti õigesse asendisse.



3.10. Üleannustamise sümptomid (esmaabi ja antidoodid, vajadusel)

Kui koer ravimkaelarihma ära sööb (mis on siiski ebatõenäoline), võivad esineda järgmised sümptomid: koordineerimata liigutused, treemor, süljevool, oksendamine, tagakeha kangus. Need sümptomid taanduvad tavaliselt 48 tunni jooksul.

Sümptomaatilise ravi kohta lisateabe saamiseks soovitame pöörduda kohaliku veterinaararsti poole.

3.11. Kasutamise eripiirangud ja kasutamise eritingimused, sealhulgas mikroobi- ja parasiidivastaste veterinaarravimite kasutamise piirangud, et vähendada resistentsuse tekke riski

Ei kohaldata.

3.12 Keelujad

Ei kohaldata.

4. FARMAKOLOOGILINE TEAVE

4.1. ATCvet kood: QP53AC11

4.2. Farmakodünaamika

Deltametriin on püretroidide gruppi kuuluv ektoparasitsiid.

Toime putukatele ja lestalistele (akariinidele) avaldub kokkupuutel deltametriiniga. Toimemehhanism põhineb putukate närvimembraanide naatriumi läbilaskvuse pideval suurenemisel. Selle tagajärjeks on hüperaktiivsus, millele järgneb halvatus (šoki mõju), värisemine ja parasiidi surm.

4.3. Farmakokineetika

Deltametriin vabaneb aeglaselt ja pidevalt ravimkaelarihmast koera karvkattesse. Toimeaine kandub kokkupuutekohast lipiididega kogu nahapinnale ja karvadele.

Deltametriin ei imendu peremeesorganismis süsteemselt.

5. FARMATSEUTILISED ANDMED

5.1. Kokkusobimatus

Ei kohaldata.

5.2. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi avamist: kohe kasutamiseks.

5.3. Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida kotikest välispakendis.

5.4. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Esmase pakendi materjal:

PET-/PE-/alumiinium-/Surlyn (ionomeer)-kotike, milles on üks kaelarihm.

Pakendi suurused:
Pappkarp, milles on 1 või 2 lastekindlat kotikest.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

5.5. Erinõuded kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest deltametriin on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.

6. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Beaphar B.V.

7. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

2187

8. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.08.2019

9. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2023

10. VETERINAARRAVIMITE KLASSIFIKATSIOON

Käsimüügiravim.

Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis
(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).