

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton mit 1 Durchstechflasche zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Trovex 1 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Milliliter enthält: Dexamethasonisonicotinat 1,00 mg (entsprechend 0,79 mg Dexamethason)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein, Katze und Hund.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind, Pferd, Schwein: intramuskuläre Anwendung

Katze, Hund: intramuskuläre Anwendung, subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

Milch: 60 Stunden

Pferde:

Essbare Gewebe: 63 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Emdoka

14. ZULASSUNGNUMMERN

DE: V7000410.00.00
AT: Z.Nr.: 841009

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Durchstechflasche zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Trovex

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder Milliliter enthält: Dexamethasonisonicotinat 1,00 mg (entsprechend 0,79 mg Dexamethason)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis: ...