

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Apiguard, 12,5 g geel meemesilastele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 annus (50g) sisaldab:

Toimeaine:

Tümool 12,5 g

Abiained:

Abiainete ja muude koostisosade kvalitatiivne koostis
Karbomeer
Trolamiin
Puhastatud vesi

Kergelt opalestsentne, värvitu kuni roosa teraline geel.

3. KLIINILISED ANDMED

3.1 Loomaliigid

Meemesilane (*Apis mellifera*).

3.2 Näidustused loomaliigiti

Varroa destructor'i põhjustatud varroatoosi ravi meemesilastel (*Apis mellifera*).

3.3 Vastunäidustused

Ei ole teada.

3.4 Erihoiatused

Ettenähtud annustamisskeemist tuleb rangelt kinni pidada, sest ebaõige annustamine võib kahjustada mesilasperet.

3.5 Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Mee maitse võimaliku rikkumise vältimiseks mitte ravida mee korje ajal.

Ravi võib teha kohe pärast taru katete eemaldamist.

Mitte kasutada ravimit, kui eeldatav maksimaalne päevane temperatuur ravi ajal on alla 15°C või pere aktiivsus on väga madal või kui õhutemperatuur on üle 40°C.

Nõrgad pered tuleb enne ravimist ühendada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Võimaliku kontaktdermatiidi ning naha ja silmade ärrituse ennetamiseks tuleb vältida ravimi otsest nahale ja silma sattumist.

Ravimi käsitlemisel kasutada kaitsekindaid ning tavapärasest kaitseriietust. Pärast ravimi manustamist pesta käed ja ravimiga kokkupuutunud riided seebi ja veega.

Juhuslikul ravimi nahale sattumisel pesta ravimiga kontaktis olnud piirkonda põhjalikult seebi ja veega.

Juhuslikul ravimi silma sattumisel pesta silmi põhjalikult suure hulga voolava veega ja konsulteerida silmaarstiga.

Mitte sisse hingata.

3.6 Kõrvaltoimed

Meemesilane (*Apis mellifera*):

Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud):	Ärevus ¹ Haudme vähenemine ²
---	---

¹Ravi ajal võib esineda mesilaspere kerge ärritus.

²Raviaegse õhutemperatuuri ootamatu tõusu ajal võib esineda noorte mesilaste juurdekasvu vähenemist. See on mööduva iseloomuga ja pere arengule mingit mõju ei avalda.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab veterinaarravimi ohutuse pidevat jälgimist. Teatised tuleb eelistatavalt veterinaararsti kaudu saata müügiloa hoidjale või tema kohalikule esindajale või riikliku teavitussüsteemi kaudu riigi pädevale asutusele. Vastavad kontaktandmed on pakendi infolehes.

3.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Ei rakendata.

3.8 Koostoime teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

3.9 Manustamisviis ja annustamine

Tarusisene.

Ühe mesilaspere ravi: manustada 2 alumiiniumist alusel olevat annust (50 g geeli) pere kohta kahlenädalase intervalliga.

Ravida maksimaalselt 2 korda aastas.

Manustamine:

Avage taru. Eemaldage ravimialuse nurgalt fooliumkate. Asetage avatud ravimialus taru keskele raamide kohale, geeliga ülespoole.

Veenduge, et ravimialuse ja taru kaane vahel oleks vähemalt 0,5 cm vaba ruumi. Sulgege taru. Kahe nädala möödudes asendage ravimialus samu juhiseid järgides uuega. Jätke ravim taru nii kauaks, kui alused on tühjad. Enne uute töomesilaste lisamist eemaldage ravim tarust.

Ravimi efektiivsus on suurem, kui seda kasutada hilissuvel pärast meekorje lõppu (kui mesilaste hulk peres on juba vähenenud). Raskete lestainfestatsioonide korral võib ravimit siiski kasutada ka kevadel, kui õhutemperatuur on juba üle 15°C.

Ravimi efektiivsus peredes võib sõltuvalt manustamise meetodist varieeruda. Seetõttu tuleb ravimit kasutada ühe osana kahjurite tõrje programmis ja lestade esinemist tuleb regulaarselt jälgida. Kui täheldatakse lestade rohkest järgneva talve või kevade jooksul, on soovitatav talvel või kevadel läbi viia täiendav varroalestate vastane ravi.

Kõiki mesila mesilasperesid tuleb ravida samaaegselt.

3.10 Üleannustamise sümptomid (esmaabi ja antidoodid, vajadusel)

Soovitavatest suuremate annuste kasutamisel (1 alumiiniumalusel olevale 50 g geelile vastab 12,5 g tümooli) võib esineda häireid mesilaspere käitumises (agiteeritus, taru mahajätmine, suurenenud surevus). Üleannustamise korral eemaldage liigne ravimihulk mesitarust.

3.11 Kasutamise eripiirangud ja kasutamise eritingimused, sealhulgas mikroobi- ja parasiidivastaste veterinaarravimite kasutamise piirangud, et vähendada resistentsuse tekke riski

Ei rakendata.

3.12 Keeluajad

Mesi: 0 päeva.

Meekorje ajal mitte ravida.

4. FARMAKOLOOGILINE TEAVE

4.1 ATCvet kood:

QP53AX22

4.2 Farmakodünaamika

Tümoolil on akaritsiidne toime. Tema täpne toimemehhanism on siiski ebaselge. Ta toimib lestadesse sissehingamise ja otsese kontakti kaudu. Üks võimalikest toimemehhanismidest on lestade valgu denaturalisatsioon.

4.3 Farmakokineetika

Arvatakse, et 2/3 toimest avaldub sissehingamisel ja 1/3 otsesest kontaktist mesilaste kaudu. Ometi võib mõlema toimimisviisi osatähtsus varieeruda sõltuvalt ilmastikutingimustest ja mesilaste aktiivsusest.

5. FARMATSEUTILISED ANDMED

5.1 Kokkusobimatus

Ei rakendata.

5.2 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat

5.3 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida ravimi läheduses pestitsiidide ega muid keemilisi aineid, mis võivad saastada ravimit.

5.4 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Alumiiniumist alus ja kate.

Karbis 10 ravimialust (50 g geeli igal alusel).

5.5 Erinõuded kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest tümool võib olla ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.

6. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Vita Bee Health Limited

7. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1212

8. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06/02/2004

9. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

August 2024

10. VETERINAARRAVIMITE KLASSIFIKATSIOON

Käsimüügiravim.

Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).